


5. HERBÁCEAS COM FLOR TIPO TREMOCEIRO

Lotus conimbricensis

CORNICHÃO-BRANCO*

Ecologia: pousios e clareiras de matos; em solos ácidos e temporariamente húmidos.



FABACEAE



30 m
a 520 m
(850 m)

Lens nigricans

LENTILHAS-BRAVAS

Ecologia: pousios, clareiras de matos; em solos pedregosos e pobres.

Plantas semelhantes: *Lens lamottei*. No estado vegetativo, espécies do género *Vicia*.



FABACEAE



120 m
a 800 m

Ornithopus perpusillus

SERRADELA-MIÚDA, SERRADELA-BRAVA

Ecologia: prados, pastagens, clareiras de matos; em solos ácidos e em zonas de montanha.

Plantas semelhantes: *Ornithopus sativus*, *O. compressus*.



FABACEAE




20 m
a 1500 m
(1610 m)

Ornithopus sativus

SERRADELA-BRANCA,
SERRADELA-DE-GARRA

Ecologia: prados anuais, pastagens; em solos ácidos; também cultivada em pastagens.

Plantas semelhantes: *Ornithopus compressus*, *O. perpusillus*.



FABACEAE



10 m
a 780 m
(1630 m)



Melilotus albus

ANAFE-BRANCA

Ecologia: arvense e ruderal, também nas margens de rios; em solos húmidos.



FABACEAE



10 m
a 740 m
(1110 m)



Galega officinalis

GALEGA, CAPRÁRIA, ARRUDA-CAPRÁRIA

Ecologia: prados húmidos, nas margens de rios.

Plantas semelhantes: Galega cirujanoi (rara), Melilotus albus.



FABACEAE




210 m
a 570 m



Erophaca baetica

ALFAVACA-DOS-MONTES, ALFAVACA-SILVESTRE

Ecologia: orlas de matagais e bosques; geralmente em locais frescos.



FABACEAE



10 m
a 470 m
(660 m)




Fumaria parviflora

FUMÁRIA-DE-FLORES-PEQUENAS*, FUMÁRIA-MENOR

Ecologia: campos agrícolas, pousios.

Plantas semelhantes: Fumaria vaillantii (rara).



PAPAVERACEAE




50 m
a 590 m

Teucrium spinosum

CAMÉDPIO-ESPINHOSO*

Ecologia: pousios, clareiras de matos; em solos básicos.



LAMIACEAE



40 m
a 230 m

Teucrium pseudochamaepitys

CAMÉDPIO-DE-FOLHA-ESTREITA*

Ecologia: prados rupícolas, clareiras e orlas de matos; em solos básicos e pedregosos.



LAMIACEAE



10 m
a 280 m

Ajuga iva

ERVA-CRINA, IVA-MOSCADA

Ecologia: pastagens, clareiras de matos; em solos compactados.



LAMIACEAE



20 m
a 410 m

Sideritis romana

SIDERITA-MIÚDA*

Ecologia: pousios, clareiras de matos; em solos pedregosos, básicos.

Plantas semelhantes: Stachys arvensis.



LAMIACEAE



20 m
a 350 m




Stachys germanica

BETÔNICA-BRANCA*

Ecologia: orlas de bosques e matagal, pousios; em solos básicos.




LAMIACEAE




Stachys ocymastrum

RABO-DE-RAPOSA

Ecologia: arvense e em pousios e clareiras de matos; geralmente em solos básicos.



LAMIACEAE




Melissa officinalis

ERVA-CIDREIRA

Ecologia: bosques, em locais sombrios e húmidos; também escapada de cultivo.



LAMIACEAE



Origanum vulgare subsp. virens


ORÉGÃO

Ecologia: orlas de bosques e matagais, pousios, prados.

Plantas semelhantes: no estado vegetativo, Calamintha nepeta.



LAMIACEAE




Lycopus europaeus

MARROIO-D'ÁGUA

Ecologia: margens de lagoas e cursos de água; em sítios encharcados.




LAMIACEAE




Prunella laciniata

CONSOLIDA-MENOR,
ERVA-FÉRREA-BRANCA*

Ecologia: prados, clareiras de matos; em solos húmidos.



LAMIACEAE



Salvia argentea


SALVA-BRANCA

Ecologia: pastagens, pousios, bermas de caminhos; em solos pedregosos, secos.

Plantas semelhantes: *Salvia aethiopis*.



LAMIACEAE




Marrubium vulgare

MARROIO-BRANCO

Ecologia: entulhos, bermas de caminhos, pastagens; em solos nitrofilizados; ruderal.

Plantas semelhantes: *Ballota hirsuta*.



LAMIACEAE






Anarrhinum duriminium

SAMACALO-PELUDO*, MACERÓVIA-DO-
-DOURO*

Ecologia: rochedos, escarpas, taludes; em substratos ácidos.



PLANTAGINACEAE



Antirrhinum graniticum

BOCAS-DE-LOBO-DO-DOURO*

Ecologia: fendas de rochedos, muros, cascalheiras, bermas de caminhos; em solos pedregosos, ácidos.

Plantas semelhantes: *Antirrhinum meonanthum*.



PLANTAGINACEAE



Misopates calycinum


FOCINHO-DE-RATO-BRANCO*

Ecologia: arvense e em pousios, taludes, cascalheiras; em solos básicos.

Plantas semelhantes: *Misopates orontium*.




PLANTAGINACEAE




Melampyrum pratense
subsp. latifolium

TRIGO-DE-VACA

Ecologia: bosques caducifólios, pinhais; em sítios sombrios.



OROBANCHACEAE



Bartsia trixago


FLOR-DE-OURO

Ecologia: prados húmidos; indiferente edáfica.

Plantas semelhantes: a forma com flores amarelas pode ser confundida com *Parentucellia viscosa*.




OROBANCHACEAE



Acanthus mollis

ACANTO, ACANTO-DOS-POETAS

Ecologia: naturalizada em matas, margens de rios; umbrófila e nitrófila.



ACANTHACEAE



Lindernia dubia


LINDÉRNIA*

Ecologia: naturalizada em solos temporariamente encharcados; margens de charcos e cursos de água, arrozais.

Plantas semelhantes: espécies do género *Gratiola*.




LINDERNIACEAE




Cephalanthera longifolia

HELEBORINA-BRANCA*

Ecologia: bosques e matagais; indiferente edáfica.



ORCHIDACEAE





Pinguicula lusitanica

PINGUÍCULA

Ecologia: margens e taludes de cursos de água e charcos; em solos ácidos e muito húmidos, arenosos ou turfosos, com escorrência de água.

Plantas semelhantes: *Pinguicula vulgaris* (muito rara).



LENTIBULARIACEAE



20 m
a 930 m
(1320 m)



Viola arborescens

VIOLETA-DE-SAGRES*

Ecologia: matos; em substratos básicos, perto do litoral.



VIOLACEAE



10 m
a 60 m





Viola kitaibeliana

VIOLETA-DOS-CAMPOS, ERVA-DA-TRINDADE

Ecologia: arvense e em prados e pastagens, por vezes também em areias litorais.

Plantas semelhantes: *Viola arvensis*.



VIOLACEAE



10 m
a 940 m
(1330 m)



Reseda media

RESEDA-BRAVA*

Ecologia: pastagens, clareiras de matos, bermas de caminhos; em solos pobres, ácidos.

Plantas semelhantes: *Reseda phyteuma* e *Sesamoides purpurascens*.



RESEDACEAE



10 m
a 690 m
(990 m)

Sesamoides purpurascens

ESTRELETA, ESTRELITA, RESEDA-PARDA*

Ecologia: pastagens, pousios e bermas de caminhos; em solos pobres, pedregosos, geralmente ácidos.

Plantas semelhantes: *Reseda media* e outras espécies do género *Sesamoides*.



RESEDACEAE



10 m
a 1060 m
(1490 m)



Circaea lutetiana


ERVA-DE-SANTO-ESTÊVÃO,
ERVA-DAS-FEITICEIRAS

Ecologia: bosques caducifólios; em locais húmidos e sombrios.



20 m
a 650 m

LYTHRACEAE





Coronilla repanda

PASCOINHAS-PEQUENAS*

Ecologia: matos, pousios, campos agrícolas, bermas de caminhos.

Plantas semelhantes: *Coronilla scorpioides*.



FABACEAE

10 m
a 830 m
(1160 m)




Coronilla scorpioides

PASCOINHAS-ESCORPIÃO*

Ecologia: arvense e em pousios; em solo básico.

Plantas semelhantes: *Coronilla repanda*.



FABACEAE

50 m
a 340 m




Lotus creticus

CORNICHÃO-DAS-PRAIAS, TREVO-DE-CRETA

Ecologia: dunas e arribas litorais.

Plantas semelhantes: *Lotus castellanus*.



FABACEAE


0 m
a 60 m



Lotus corniculatus

CORNICHÃO-COMUM

Ecologia: pastagens, clareiras de matos, bermas de caminhos; em solos temporariamente húmidos, ácidos.



FABACEAE

100 m
a 1600 m

Lotus pedunculatus

ERVA-COELHOIRA, CORNICHÃO-DOS-RIOS*

Ecologia: prados higrófilos, margens de cursos de água; em solos muito húmidos.



FABACEAE




10 m
a 1340 m
(1880 m)

Hymenocarpus lotoides

VULNERÁRIA-RETA*, ALBAIDA

Ecologia: prados, pastagens, clareiras de matos; em solos ácidos, arenosos ou pedregosos.

Plantas semelhantes: *Hymenocarpus hamosus*.



FABACEAE



40 m
a 840 m
(1280 m)

Scorpiurus sulcatus

CORNILHÃO

Ecologia: arvense, em pousios e clareiras de matos; geralmente em solos básicos.

Plantas semelhantes: *Scorpiurus muricatus*.



FABACEAE




10 m
a 320 m
(540 m)

Scorpiurus vermiculatus

CORNILHÃO-ESPONJOSO

Ecologia: arvense e ruderal, margens de linhas de água; indiferente edáfica.



FABACEAE



10 m
a 320 m



Ornithopus compressus

SERRADELA-AMARELA,
TREVO-PÉ-DE-PÁSSARO

Ecologia: prados anuais, pastagens, clareiras de matos; em solos ácidos.

Plantas semelhantes: *Ornithopus sativus*, *O. perpusillus*.



FABACEAE




10 m
a 860 m
(1550 m)



Argyrobolium zanonii

ERVA-DE-PRATA

Ecologia: matos baixos, prados ralos; em solos pedregosos, básicos.



FABACEAE



20 m
a 330 m



Hippocrepis biflora

ERVA-FERRADURA-DE-DUAS-FLORES*

Ecologia: pousios, campos agrícolas, bermas de caminhos; em solos pedregosos, básicos.

Plantas semelhantes: outras espécies do género *Hippocrepis*.



FABACEAE



110 m
a 220 m



Hippocrepis ciliata

ERVA-FERRADURA-CILIADA*

Ecologia: pousios, campos agrícolas, bermas de caminhos; em solos pedregosos, básicos.

Plantas semelhantes: outras espécies do género *Hippocrepis*.



FABACEAE



60 m
a 310 m

Medicago arabica

LUZERNA-ARÁBICA

Ecologia: arvense, bermas de caminhos; em solos frescos.

Plantas semelhantes: *Medicago polymorpha* e outras espécies do género *Medicago*.



FABACEAE



10 m
a 700 m
(820 m)

Medicago polymorpha

CARRAPIÇO, LUZERNA-COMUM

Ecologia: arvense, pousios e bermas de caminhos; indiferente edáfica.

Plantas semelhantes: *Medicago arabica* e outras espécies do género *Medicago*.



FABACEAE




10 m
a 640 m
(830 m)

Medicago orbicularis

LUZERNA-ORBICULAR

Ecologia: arvense e em margens de cursos de água; geralmente em solos básicos.

Plantas semelhantes: outras espécies do género *Medicago* (sem fruto).



FABACEAE




20 m
a 350 m
(820 m)

Medicago lupulina

LUZERNA-PRETA, LUZERNA-LUPULINA

Ecologia: arvense, bermas de caminhos; em solos básicos.

Plantas semelhantes: *Medicago minima* (sem frutos).



FABACEAE



10 m
a 830 m
(1460 m)




Medicago littoralis

LUZERNA-DAS-AREIAS

Ecologia: dunas e prados, em solos arenosos do litoral.

Plantas semelhantes: Medicago italica e outras espécies do género Medicago.



FABACEAE



0 m
a 120 m
(330 m)



Medicago marina

LUZERNA-DAS-PRAIAS

Ecologia: dunas.



FABACEAE



0 m
a 20 m




Trigonella monspeliaca

FENACHO-DO-SUL, LUZERNA-DO-SUL*

Ecologia: arvense, também em pastagens e clareiras de matos; em solos secos, pedregosos e básicos.

Plantas semelhantes: Trigonella polyceratia e algumas espécies do género Medicago (sem fruto).



FABACEAE



20 m
a 600 m




Melilotus spicatus

ANAFE-NAPOLITANO

Ecologia: arvense e ruderal.

Plantas semelhantes: outras espécies do género Melilotus.



FABACEAE



130 m
a 700 m

Melilotus indicus

ANAFE-MENOR, MELILOTO-DA-ÍNDIA

Ecologia: arvense e ruderal; em solos húmidos.

Plantas semelhantes: outras espécies do género *Melilotus*.



FABACEAE




10 m
a 310 m
(490 m)

Melilotus segetalis

ANAFÁ, ANAFE-MAIOR

Ecologia: arvense e ruderal; em solos húmidos, por vezes salgados.

Plantas semelhantes: outras espécies do género *Melilotus*.



FABACEAE



10 m
a 200 m
(420 m)

Ononis cintrana

JOINA-DOS-MATOS-PEQUENA*

Ecologia: matos baixos, prados ralos, pastagens; em solos pobres, ácidos.

Plantas semelhantes: *Ononis hackelii* (raro).



FABACEAE




10 m
a 290 m

Ononis pusilla

JOINA-PEQUENA*

Ecologia: matos baixos, prados ralos; em solos pedregosos, básicos.



FABACEAE



30 m
a 480 m




Ononis viscosa subsp. breviflora


JOINA-VISCOSA-DE-FLOR-PEQUENA*

Ecologia: arvense e em pousios e bermas de caminhos; em solo básico.

Plantas semelhantes: Ononis viscosa subsp. brachycarpa.



FABACEAE




Ononis pubescens


JOINA-VISCOSA-MAIOR*

Ecologia: arvense e ruderal; em solos básicos.

Plantas semelhantes: Ononis viscosa.



FABACEAE




Lupinus luteus

TREMOCILHA, TREMOCEIRO-AMARELO

Ecologia: arvense e ruderal; também cultivada para enriquecimento de solos; em solos ácidos.



FABACEAE




Aristolochia paucinervis


ERVA-BICHA, ESTRELAMIM, ARISTOLÓQUIA

Ecologia: prados em margens de linhas de água, bosques; em solos frescos.

Plantas semelhantes: Aristolochia pistilochia.



ARISTOLOCHIACEAE



© N...
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. NÃO É PERMITIDA A COMERCIALIZAÇÃO

Phlomis lychnitis

SALVA-BRAVA, SALVA-DA-SERRA,
CANDEIOLAS

Ecologia: matos baixos, prados; em solos básicos e pedregosos.



LAMIACEAE



I 60 m
a 530 m

Parentucellia viscosa

ERVA-PEGANHENTA

Ecologia: prados húmidos, pastagens; em solos húmidos e algo nitrofilizados.

Plantas semelhantes: *Bartsia trixago* (forma de flores amarelas).



OROBANCHACEAE



I 10 m
a 750 m
(940 m)

Rhinanthus minor

GALOCRISTA

Ecologia: prados húmidos, lameiros, clareiras de bosques caducifólios.



OROBANCHACEAE




I 520 m
a 1330 m

Odontitella virgata

ERVA-MATA-PULGA-AMARELA*

Ecologia: prados secos, clareiras de matos e bosques.



OROBANCHACEAE



I 10 m
a 890 m
(1290 m)




Nothobartsia asperima

ESCAMÉDRIO

Ecologia: matos e orlas de bosques.



OROBANCHACEAE



Linaria bipunctata subsp. glutinosa

ANSARINA-DO-SUDOESTE*

Ecologia: dunas litorais.

Plantas semelhantes: Linaria bipunctata subsp. bipunctata.



PLANTAGINACEAE



Linaria spartea


ANSARINA-DOS-CAMPOS, AVELINO

Ecologia: pousios, pastagens, campos agrícolas, clareiras de matos; em solos arenosos, ácidos.

Plantas semelhantes: Linaria viscosa.




PLANTAGINACEAE




Linaria saxatilis

ANSARINA-DAS-ROCHAS*

Ecologia: rochedos, pastagens; em solos secos, pedregosos ou arenosos, ácidos.



PLANTAGINACEAE



© N

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. NÃO É PERMITIDA A COMERCIALIZAÇÃO

Linaria polygalifolia subsp. *lamarckii*


ANSARINA-DA-PRAIA*

Ecologia: dunas litorais.

Plantas semelhantes: *Linaria polygalifolia* subsp. *polygalifolia*.



PLANTAGINACEAE




Linaria supina subsp. *supina*


ANSARINA-AMARELA-DOS-CALCÁRIOS*

Ecologia: clareiras de matos, rochedos, taludes; em solos rochosos ou pedregosos, de origem calcária.

Plantas semelhantes: *Linaria supina* subsp. *maritima*



PLANTAGINACEAE



Linaria hirta


LINÁRIA-DOS-POUSIOS*

Ecologia: arvense, associada a culturas agrícolas de sequeiro; em solos argilosos, básicos.

Plantas semelhantes: *Linaria supina* subsp. *maritima*.



PLANTAGINACEAE




Kickxia spuria subsp. *integrifolia*


ESPORAS-COMUNS*

Ecologia: campos cultivados, pousios, bermas de caminhos; em solos revolvidos, algo argilosos e pedregosos.

Plantas semelhantes: *Kickxia elatine*.



PLANTAGINACEAE






Tropaeolum majus

CAPUCHINHAS, CHAGAS

Ecologia: naturalizada em matas, taludes, entulhos e locais perturbados; em locais sombrios.




TROPAEOLACEAE




Viola langeana

VIOLETA-AMARELA*

Ecologia: clareiras de matos, taludes e prados; em solos ácidos em zonas de montanha.




VIOLACEAE




Gennaria diphylla

SATIRIÃO-DE-DUAS-FOLHAS*

Ecologia: orlas de matagais; em solos ácidos, principalmente.



ORCHIDACEAE




Reseda luteola

LÍRIO-DOS-TINTUREIROS

Ecologia: pastagens, pousios e bermas de caminhos; em solos pobres; indiferente edáfica.



RESEDACEAE



Ononis reclinata


UNHA-DE-GATO

Ecologia: prados anuais, em solos rochosos ou pedregosos, básicos.

Plantas semelhantes: *Ononis dentata*.



FABACEAE




Ononis baetica


JOINA-ROSADA-DAS-AREIAS*

Ecologia: prados, clareiras de matos e pinhais; em solos arenosos.

Plantas semelhantes: *Ononis diffusa*, *O. broteriana*, *O. pinnata*.



FABACEAE




Ononis spinosa

UNHA-DE-GATO-ESPINHOSA, GATUNHA, RESTA-BOI

Ecologia: pousios, pastagens, bermas de caminhos; em solos secos.




FABACEAE




Ononis mitissima

TILHA-BOI, UNHA-DE-GATO-MACIA*

Ecologia: pousios, pastagens, clareiras de matos; em solos secos, básicos.



FABACEAE






Onobrychis humilis

SANFENO-BRAVO

Ecologia: prados ralos, pousios; em solos pobres, pedregosos e ácidos.

Plantas semelhantes: *Onobrychis viciifolia* e, no estado vegetativo, *Hedysarum glomeratum*.



FABACEAE



10 m
a 360 m



Astragalus echinatus

ALFAVACA-RASTEIRA*

Ecologia: pastagens, clareiras de matos; em solos secos, principalmente básicos.

Plantas semelhantes: *Astragalus glauca* (raro) e outras leguminosas herbáceas, no estado vegetativo.



FABACEAE




20 m
a 340 m



Polygala monspeliaca

POLÍGALA-DE-MONTPELLIER*

Ecologia: prados, pastagens, clareiras de matos; em solos básicos.



POLYGALACEAE




20 m
a 350 m
(490 m)



Platycodon spicata

SANGUE-DE-CRISTO

Ecologia: campos agrícolas, pousios, fendas de muros e rochedos.



PAPAVERACEAE



60 m
a 550 m
(660 m)

Lamium maculatum

CHUCHAS

Ecologia: orlas de bosques, margens de cursos de água; em locais húmidos e sombrios.



LAMIACEAE



10 m
a 1140 m
(1750 m)

Lamium amplexicaule

CHUPAPITOS, CHUCHA-PITOS

Ecologia: orlas de matagais, prados húmidos, campos agrícolas.

Plantas semelhantes: *Lamium coutinhoi*, *L. hybridum*, *L. geovorens*.



LAMIACEAE



5 m
a 850 m
(1040 m)

Lamium purpureum

CHUCHAS-PEQUENAS*, LÂMIO-ROXO

Ecologia: orlas de bosques, prados húmidos, campos agrícolas.

Plantas semelhantes: *Lamium coutinhoi*.



LAMIACEAE




10 m
a 770 m
(910 m)

Scutellaria minor

ESCUTELÂRIA-MENOR*

Ecologia: prados húmidos, juncais, também na orla de bosques e matagais; em solos ácidos e húmidos.

Plantas semelhantes: *Scutellaria galericulata*.



LAMIACEAE



10 m
a 1150 m



Ballota nigra

MARROIO-NEGRO, ERVA-DAS-LAMPARINAS

Ecologia: entulhos, bermas de caminhos, orlas de bosque; em solos nitrofilizados; ruderal.

Plantas semelhantes: *Ballota hirsuta*, *Marrubium vulgare*.



LAMIACEAE



10 m
a 850 m



Clinopodium vulgare

CLINOPÓDIO, ZÓPIRO

Ecologia: orlas de bosques e matagais; em locais algo sombrios.



LAMIACEAE



30 m
a 1110 m
(1420 m)




Stachys arvensis

RABO-DE-RAPOSA MENOR*

Ecologia: arvense e em pastagens e clareiras de matos; indiferente edáfica.

Plantas semelhantes: *Sideritis romana*.



LAMIACEAE




5 m
a 620 m
(1280 m)



Stachys officinalis

BETÓNICA

Ecologia: matos baixos, prados perenes; em solos ácidos.



LAMIACEAE




20 m
a 1090 m
(1370 m)

Micromeria graeca

HISSOPO-BRAVO, ZOPE, MICROMÉRIA*

Ecologia: matos baixos, rochedos; em substratos básicos, secos e pedregosos.



LAMIACEAE



10 m
a 420 m

Parentucellia latifolia

ERVA-PEGANHENTA-PEQUENA*

Ecologia: prados anuais, pastagens; em solos arenosos ou pedregosos, algo húmidos.



OROBANCHACEAE




100 m
a 840 m

Pedicularis sylvatica subsp. lusitanica

ERVA-PIOLHEIRA

Ecologia: turfeiras, prados higrófilos; em solos húmidos, ácidos.



OROBANCHACEAE




20 m
a 1840 m
(1960 m)

Linaria aeruginea

ANSARINA-VERMELHA*

Ecologia: pousios, clareiras de matos, taludes; em solos pedregosos.



PLANTAGINACEAE



80 m
a 710 m



Misopates orontium


FOCINHO-DE-RATO-ROSA*

Ecologia: arvense, rupícola; em solos perturbados e algo nitrofilizados; geralmente em solos ácidos.

Plantas semelhantes: *Misopates calycinum*.



PLANTAGINACEAE



Antirrhinum cirrherum

BOCAS-DE-LOBO-DAS-DUNAS*

Ecologia: matos em dunas e arribas litorais.

Plantas semelhantes: *Antirrhinum linkianum*.



PLANTAGINACEAE



Digitalis purpurea subsp. purpurea


DEDALEIRA, ABELOURA, ESTALINHOS, TRAQUES

Ecologia: bosques, matos, sebes, taludes; em sítios frescos e sombrios, geralmente ácidos.

Plantas semelhantes: *Digitalis purpurea* subsp. *amandiana*, *D. thapsi*.



PLANTAGINACEAE




Digitalis thapsi


DEDALEIRA-DAS-ROCHAS, ABOLEIRA, PEGAJO

Ecologia: fendas de rochas, clareiras de matos; em solos ácidos, pobres.

Plantas semelhantes: *Digitalis purpurea*.



PLANTAGINACEAE



Scrophularia herminii

CHUPADEIRA, ESCROFULÁRIA-DA-ESTRELA*

Ecologia: rochedos, margens de regatos de montanha; em locais sombrios e húmidos e substratos ácidos.

Plantas semelhantes: *Scrophularia bourgaeana*.



SCROPHULARIACEAE




70 m
500 m
a 1960 m

Scrophularia canina subsp. canina

ESCROFULÁRIA-CANINA,
ESCROFULÁRIA-MENOR

Ecologia: depósitos de cascalho nas margens de rios, bermas de caminhos; em solos pedregosos, revolidos.



SCROPHULARIACEAE



10 m
a 820 m
(1010 m)

Scrophularia scorodonia

ERVA-DO-MAU-OLHADO, TROLHA

Ecologia: orlas de bosques e matagais, frequentemente ripícolas; em locais frescos e sombrios.



SCROPHULARIACEAE



10 m
a 870 m
(1360 m)

Scrophularia auriculata

ERVA-DAS-ESCALDADELAS

Ecologia: margens de cursos de água, paus; em solos encharcados.

Plantas semelhantes: *Scrophularia lyrata*.



SCROPHULARIACEAE



10 m
a 920 m




Scrophularia sambucifolia


ESCRFULÁRIA-FOLHA-DE-SABUGUEIRO*

Ecologia: taludes, margens de linhas de água; geralmente em solos profundos, básicos.

Plantas semelhantes: *Scrophularia grandiflora*.




SCROPHULARIACEAE




Fedia cornucopiae

CHUCHAPITOS, CORNUCÓPIA, ALFACE-DE-ARGEL

Ecologia: arvense; em solos básicos.



CAPRIFOLIACEAE



Epipactis helleborine


HELEBORINA-COMUM, HELEBORINHA

Ecologia: bosques, pinhais e matagais; em locais frescos, em diversos substratos.

Plantas semelhantes: outras orquídeas do género *Epipactis*.



ORCHIDACEAE




Epipactis tremolsii


HELEBORINA-VERMELHA*

Ecologia: clareiras de matos, matagais e bosques; em locais abertos e secos, em solos pedregosos, geralmente básicos.

Plantas semelhantes: outras orquídeas do género *Epipactis*.



ORCHIDACEAE





I 20 m
a 350 m
(870 m)






Astragalus hamosus

ALFAVACA-DE-GANCHO*, ALFAVACA-ANZOL

Ecologia: pastagens e pousios; principalmente em solos básicos.

Plantas semelhantes: outras leguminosas herbáceas, no estado vegetativo.



FABACEAE





Astragalus epiglottis

SAVEIRINHO-PRATEADO*

Ecologia: pastagens, pousios, clareiras de matos; em solos secos e pedregosos, básicos.

Plantas semelhantes: Outras leguminosas herbáceas, no estado vegetativo.



FABACEAE





Astragalus pelecinus

SAPATETAS, SENRAS

Ecologia: pastagens e pousios; principalmente em solos ácidos.

Plantas semelhantes: outras leguminosas herbáceas, no estado vegetativo.




FABACEAE



Vicia narbonensis

FAVETA-DE-BEJA

Ecologia: orlas de bosques, margens de cursos de água; em solos frescos.



FABACEAE

Hedysarum glomeratum


SANFENO-CALCÍCOLA*

Ecologia: matos baixos, prados ralos; em solos pedregosos, secos e básicos.

Plantas semelhantes: no estado vegetativo, *Onobrychis humilis*.



FABACEAE




Lupinus gredensis


TREMOCEIRO-BRAVO,
TREMOCEIRO-DE-GREDOS*

Ecologia: arvense e ruderal; em solos ácidos.

Plantas semelhantes: *Lupinus hispanicus*.



FABACEAE




Lupinus angustifolius

TREMOCEIRO-BRAVO, TREMOCEIRO-AZUL,
TREMOCEIRO-DE-FOLHA-ESTREITA

Ecologia: arvense e ruderal, também em dunas; em solos ácidos, geralmente arenosos.



FABACEAE




Lupinus micranthus


TREMOCEIRO-HIRSUTO*

Ecologia: arvense e ruderal; em solos ácidos.

Plantas semelhantes: *Lupinus cosentinii*.



FABACEAE





Medicago sativa

LUZERNA, ALFAFA

Ecologia: cultivada e naturalizada em taludes, pastagens, bermas de caminhos.

Plantas semelhantes: Medicago falcata.



FABACEAE




I 10m
a 790m



Lobelia urens

QUEIMA-LÍNGUA, LOBÉLIA-BRAVA,
LOBÉLIA-ACRE

Ecologia: prados húmidos, orlas de charcos.



CAMPANULACEAE



I 10m
a 980m
(1360m)



Polygala microphylla

POLÍGALA-DA-MONTANHA*

Ecologia: matos; em sítios rochosos e secos, em substratos ácidos.



POLYGALACEAE



I 130m
a 1380m




Polygala vulgaris

ERVA-LEITEIRA, POLÍGALA-COMUM*

Ecologia: prados, clareiras de matos, sebes.

Plantas semelhantes: Polygala serpyllifolia.



POLYGALACEAE



I 30m
a 1230m
(1580m)

© N


DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. NÃO É PERMITIDA A COMERCIALIZAÇÃO

Delphinium gracile


ESPORINHAS

Ecologia: pousios e pastagens; em solos secos.

Plantas semelhantes: *Delphinium halteratum*, *D. nanum*.



RANUNCULACEAE




Delphinium pentagynum


PASSARINHOS, DELFÍNIO*

Ecologia: orlas de matagais, taludes, rochedos; em solos secos, pedregosos e preferentemente calcários.

Plantas semelhantes: no estado vegetativo, algumas espécies do género *Ranunculus*



RANUNCULACEAE




Aquilegia vulgaris

ERVA-POMBINHA, FIDALGUINHOS, AQUILÉIA

Ecologia: bosques caducifólios, margens de cursos de água; em locais sombrios e frescos.



RANUNCULACEAE




Echium lusitanicum


SOAJOS

Ecologia: prados e pastagens, orlas de bosques, clareiras de matos, bermas de caminhos; em solos ácidos; em zonas de montanha.

Plantas semelhantes: *Echium salmanticum*.



BORAGINACEAE





Echium plantagineum



SOAGEM, CHUPA-MEL, LÍNGUA-DE-VACA

Ecologia: arvense e ruderal, pousios; indiferente edáfica.

Plantas semelhantes: *Echium creticum*, *E. vulgare*.



BORAGINACEAE




Echium rosulatum

SOAGEM-DAS-VÍBORAS,
CARDO-DAS-VÍBORAS

Ecologia: ruderal; em solos nitrofilizados e algo húmidos.



BORAGINACEAE



Echium tuberculatum


SOAGEM-VIPERINA, VIPERINA

Ecologia: clareiras de matos, bermas de caminhos.

Plantas semelhantes: *Echium creticum*, *E. vulgare*, *E. gaditanum*.





BORAGINACEAE




Ajuga pyramidalis subsp. meonantha

BÚGULA-PIRAMIDAL

Ecologia: prados de montanha, bosques caducifólios; em sítios húmidos e sombrios.



LAMIACEAE



Salvia sclareoides

SALVA-DO-SUL,
SALVA-VISCOSA-DOS-MONTES*

Ecologia: clareiras de matagais, prados; em solos pedregosos, básicos.

Plantas semelhantes: *Salvia verbenaca*.



LAMIACEAE




30 m
a 390 m
(640 m)

Salvia verbenaca

SALVA-DOS-CAMINHOS, ERVA-CRISTA,
JARVÃO

Ecologia: pastagens, bermas de caminhos, campos cultivados, terrenos perturbados; em solos algo nitrofilizados.

Plantas semelhantes: *Salvia sclareoides*.



LAMIACEAE




20 m
a 780 m
(1320 m)

Cleonia lusitanica

CLEÓNIA*

Ecologia: clareiras de matos, prados anuais; em solos básicos, secos e pedregosos.



LAMIACEAE




30 m
a 340 m

Prunella vulgaris

PRUNELA, ERVA-FÉRREA

Ecologia: prados húmidos, margens de lagoas ou cursos de água; indiferente edáfica.

Plantas semelhantes: *Prunella grandiflora*.



LAMIACEAE



5 m
a 980 m
(1530 m)




Glechoma hederacea

HERA-TERRESTRE

Ecologia: bosques caducifólios; em sítios húmidos e sombrios.



LAMIACEAE




Odontites vernus

GALOCRISTA-ROXO*

Ecologia: pousios, searas, bermas de caminhos, clareiras de matos; indiferente edáfica.



OROBANCHACEAE




Linaria micrantha

LINÁRIA-MIÚDA*

Ecologia: arvense, pousios; em solos argilosos, básicos.



PLANTAGINACEAE





Linaria amethystea subsp. amethystea


POMBINHAS, ANSARINA-AMETISTA*

Ecologia: pousios, pastagens, campos agrícolas, clareiras de matos; em solos ácidos.

Plantas semelhantes: *Linaria diffusa*, *L. intricata*, *L. algarviana*, *L. ricardoi*.



PLANTAGINACEAE



© N

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. NÃO É PERMITIDA A COMERCIALIZAÇÃO


Linaria pedunculata

ANSARINA-ROXA-DAS-PRAIAS*

Ecologia: praias e dunas litorais.



PLANTAGINACEAE




Linaria elegans


ANSARINA-ELEGANTE*

Ecologia: prados, pastagens; em solos ácidos, pobres.

Plantas semelhantes: *Linaria incarnata*.



PLANTAGINACEAE



Linaria ricardoi


LINÁRIA-DOS-OLIVAIS*

Ecologia: arvense, associada a culturas agrícolas de sequeiro; em solos argilosos, básicos.

Plantas semelhantes: *Linaria amethystea*, *L. algarviana*.




PLANTAGINACEAE




Linaria triornithophora

ESPORAS-BRAVAS

Ecologia: orlas de bosques caducifólios e matagais, taludes; em locais sombrios e em substratos ácidos.



PLANTAGINACEAE






Cymbalaria muralis

RUÍNAS, CIMALÁRIA

Ecologia: subespontânea em fendas de rochas, muros e paredes; em locais sombrios.




PLANTAGINACEAE




Kickxia cirrhosa

ESPORAS-DE-GAVINHAS*

Ecologia: prados húmidos, margens de charcos; em solos húmidos, arenosos e ácidos.



PLANTAGINACEAE



Chaenorhinum organifolium


BOQUINHAS-DE-LOBO-FOLHA-DE-ORÉGÃO*

Ecologia: fendas de rochas, clareiras de matos; em solos pedregosos e básicos.

Plantas semelhantes: Chaenorhinum segoviense (muito raro), C. serpyllifolium.



PLANTAGINACEAE



Anarrhinum bellidifolium


SAMACALO, MACERÓVIA

Ecologia: clareiras de matos, taludes, escarpas; em solos pobres, secos e pedregosos, ácidos.

Plantas semelhantes: Anarrhinum longipedicellatum (muito localizado).



PLANTAGINACEAE



Viola palustris

VIOLETA-PALUSTRE*

Ecologia: matos higrofilos; em solos ácidos e húmidos.

Plantas semelhantes: *Gratiola officinalis* e *Lindernia dubia*.



VIOLACEAE




20 m
a 1360 m
(1880 m)

Viola riviniana

VIOLETA-BRAVA, VIOLETA-DE-BOSQUE

Ecologia: margens de cursos de água, bosques ripícolas; em locais frescos.

Plantas semelhantes: *Viola lactea*, *V. canina*, *V. odorata*, *V. riviniana*.



VIOLACEAE




20 m
a 1220 m
(1540 m)

Gratiola linifolia

GRACÍOLA, ERVA-DO-POBRE, LENIFÓLIO

Ecologia: leitos e margens de cursos de água; em solos encharcados.

Plantas semelhantes: *Gratiola officinalis* e *Lindernia dubia*.



30 m
a 660 m
(820 m)

PLANTAGINACEAE



6. HERBÁCEAS COM FLOR TIPO MALMEQUER

Bellis perennis

BONINA, MARGARIDA

Ecologia: prados, clareiras de matagais, taludes; em locais algo sombrios e húmidos.

Plantas semelhantes: *Bellis sylvestris*.



10m
I a 1040m
(1160m)



ASTERACEAE






Bellis sylvestris

BONINA-DO-MONTE,
MARGARIDA-DO-MONTE

Ecologia: prados, clareiras de matagais, taludes;
em locais algo sombrios e húmidos.

Plantas semelhantes: *Bellis perennis*.



ASTERACEAE




30 m
a 830 m
(1130 m)



Bellis annua

BONINA-ANUAL, MARGARIDA-MENOR,
MARGARIDA-ANUAL

Ecologia: pastagens, clareiras de matos, caminhos;
em solos algo húmidos, frequentemente arenosos.



ASTERACEAE



10 m
a 360 m
(700 m)




Chamaemelum fuscum

MARGAÇA-DE-INVIERNO, MARGAÇA-FUSCA

Ecologia: campos agrícolas, pastagens; em solos algo
húmidos.

Plantas semelhantes: *Otospermum glabrum*,
Tripleurospermum maritimum e *Daveaua anthemoides*.



ASTERACEAE



10 m
a 660 m
(790 m)



Chamaemelum nobile

MACELA, CAMOMILA-ROMANA,
CAMOMILA-DE-PARIS, MACELA-FLOR

Ecologia: pousios, clareiras de matos, caminhos;
em solos algo húmidos e nitrificados.

Plantas semelhantes: *Leucanthemopsis pulverulenta* e
Anthemis alpestris.



ASTERACEAE



10 m
a 1230 m
(1610 m)

Anthemis arvensis


MARGAÇÃO, FALSA-CAMOMILA

Ecologia: arvense e ruderal.

Plantas semelhantes: *Cladanthus mixtus*, *Anthemis cotula* e *Anacyclus clavatus*.



ASTERACEAE



Cladanthus mixtus


MARGAÇA

Ecologia: arvense e ruderal; indiferente edáfica.

Plantas semelhantes: *Anthemis arvensis*, *Anthemis cotula* e *Anacyclus clavatus*.



ASTERACEAE



Phalacrocarpum oppositifolium subsp. oppositifolium


MARGARIDA-DAS-ROCHAS*

Ecologia: rupícola, em rochedos, escarpas e encostas pedregosas; em substrato ácido e granítico.

Plantas semelhantes: *Phalacrocarpum oppositifolium* subsp. *hoffmannseggii*.




ASTERACEAE




Erigeron karvinskianus

VITADÍNIA-DAS-FLORISTAS,
MARGARIDA-DAS-FLORISTAS

Ecologia: naturalizada em rochedos, muros; em locais sombrios e húmidos.



ASTERACEAE





Leucanthemopsis pulverulenta


MARGARIDA-PULVERULENTA*

Ecologia: pastagens, clareiras de matos, viária; em solos arenosos, ácidos.

Plantas semelhantes: *Chamaemelum nobile*.



ASTERACEAE



Glebionis coronaria


PAMPILHO, MALMEQUER

Ecologia: arvense e ruderal; em solos nitrificados.

Plantas semelhantes: a forma de lígulas amarelas é confundível com *Anacyclus radiatus* e *Heteranthesis viscidehirta* (muito raro).



ASTERACEAE



Tanacetum mucronulatum


ATANÁSIA-MAIOR

Ecologia: orlas de bosques e matagais.

Plantas semelhantes: *Tanacetum corymbosum*.



ASTERACEAE




Leucanthemum pseudosylvaticum


MARGARIDA-MAIOR-DAS-RIBEIRAS*

Ecologia: margens de ribeiras, orlas de bosques, bermas de caminhos.

Plantas semelhantes: outras espécies dos géneros *Leucanthemum* e *Tanacetum*.



ASTERACEAE




Symphotrichum squamatum

ESTRELA-COMUM*, MATA-JORNALEIROS

Ecologia: invasora em solos perturbados, húmidos.




ASTERACEAE




Achillea millefolium

MILEFÓLIO, MILFOLHADA,
ERVA-DAS-CORTADELAS

Ecologia: prados higrofilos, orlas de bosques
caducifolios; em locais húmidos e sombrios,
em montanha.



ASTERACEAE




Ageratina adenophora

ABUNDÂNCIA, INÇA-MUITO, MILHO-COZIDO

Ecologia: naturalizada em margens de cursos de água
e orlas de bosques.





ASTERACEAE




Bidens aurea

CHÁ-DE-MARROCOS, CHÁ-DE-ESPANHA

Ecologia: naturalizada em valas e margens de cursos
de água.



ASTERACEAE





Galinsoga parviflora

ERVA-DA-MODA

Ecologia: invasora em campos agrícolas e em meio urbano.

Plantas semelhantes: *Bidens pilosa*.



ASTERACEAE



10 m
a 860 m
(1080 m)




Cephalaria leucantha

SAUDADES-BRANCAS*,
SUSPIROS-BRANCOS-DOS-MONTES

Ecologia: clareiras de matos; em solos pedregosos e básicos.

Plantas semelhantes: *Succisella carvalhoana*.



CAPRIFOLIACEAE



60 m
a 430 m



Pycnocomon rutifolium

ESCABIOSA-DA-PRAIA, ARRUDA-DA-PRAIA

Ecologia: clareiras de matos e pinhais; em solos arenosos.



CAPRIFOLIACEAE



0 m
a 70 m




Valerianella discoidea

ALFACE-DE-COELHO-ROBUSTA*

Ecologia: arvense; em solos básicos.

Plantas semelhantes: outras espécies do género *Valerianella*.



CAPRIFOLIACEAE



40 m
a 340 m
(580 m)

Valerianella locusta

ALFACE-DE-COELHO, SABOISA,
VALERIANINHA, CANÓNICOS

Ecologia: arvense e ruderal.

Plantas semelhantes: outras espécies do género *Valerianella*.



CAPRIFOLIACEAE



10 m
a 730 m
(850 m)

Centranthus calcitrapae

CALCÍTRAPA

Ecologia: clareiras de matos, pousios, fendas de rochedos e muros; indiferente edáfica, algo nitrófila.



CAPRIFOLIACEAE



10 m
a 910 m
(1800 m)

Iberis procumbens subsp. procumbens

ASSEMBLEIAS

Ecologia: matos baixos, em dunas e arribas litorais; em substratos arenosos ou rochosos.

Plantas semelhantes: *Iberis procumbens* subsp. *microcarpa*.



BRASSICACEAE



10 m
a 470 m
(660 m)

Paronychia argentea

ERVA-PRATA, ERVA-DOS-UNHEIROS

Ecologia: clareiras de matos, pastagens, bermas de caminhos; em solos secos, ácidos, arenosos ou pedregosos.

Plantas semelhantes: *Paronychia capitata* (muito rara).



CARYOPHYLLACEAE



0 m
a 670 m
(930 m)




Illecebrum verticillatum

ARANHÕES, ARANHÇOS, ERVA-SANGUINHA

Ecologia: margens temporariamente inundadas de charcos e cursos de água.




CARYOPHYLLACEAE




Chaetonychcia cymosa

ERVA-DOS-UNHEIROS, PARONÍQUIA-DE-FLORES-EMPINADAS*

Ecologia: prados ralos, clareiras de matos e pinhais; em solo arenoso, ácido.



CARYOPHYLLACEAE




Mentha cervina

HORTELÃ-DA-RIBEIRA, ERVA-PEIXEIRA

Ecologia: margens e leitos de cursos de água temporários; em solos arenosos ou pedregosos.



LAMIACEAE



Mentha suaveolens


MENTASTRO, HORTELÃ-BRAVA

Ecologia: margens de lagoas e cursos de água, prados húmidos.

Plantas semelhantes: variedades cultivadas do género *Mentha*.



LAMIACEAE



Trifolium cherleri

TREVO-ENTAÇADO, FOFOS

Ecologia: pousios, pastagens, clareiras de matos; em solos pobres, secos e ácidos.

Plantas semelhantes: *Trifolium hirtum*.



FABACEAE



10 m
a 760 m

Trifolium repens

TREVO-BRANCO, TREVO-RASTEIRO

Ecologia: prados, pastagens, bermas de caminhos; em solos frescos e nitrofilizados.

Plantas semelhantes: *Trifolium michelianum*, *T. nigrescens*.



FABACEAE



0 m
a 950 m

Trifolium scabrum

TREVO-ÁSPERO

Ecologia: pousios, pastagens, clareiras de matos, bermas de caminhos; em solos pedregosos, geralmente básicos.



FABACEAE



10 m
a 780 m
(1010 m)

Trifolium glomeratum

TREVO-AGLOMERADO*

Ecologia: pousios, pastagens, clareiras de matos, bermas de caminhos; em solos pedregosos, geralmente ácidos.

Plantas semelhantes: *Trifolium cernuum*.



FABACEAE



10 m
a 880 m
(1260 m)



Trifolium subterraneum

TREVO-SUBTERRÂNEO

Ecologia: prados, pastagens, bermas de caminhos; em solos ácidos, principalmente.



FABACEAE




0 m
a 950 m



Tripodion tetraphyllum

VULNERÁRIA-DE-BALÕES*

Ecologia: arvense e em pousios e clareiras de matos; em solos básicos e pedregosos.



FABACEAE



10 m
a 340 m
(480 m)




Armeria transmontana

CRAVEIRO-DO-MONTE, CRAVEIRO-DIVINO

Ecologia: prados, clareiras de matos; em solos ácidos.

Plantas semelhantes: Armeria langei, A. sampaioi.



PLUMBAGINACEAE



150 m
a 1270 m
(1630 m)



Scandix pecten-veneris

AGULHA-DE-PASTOR, ERVA-AGULHA, GARFINHOS

Ecologia: arvense.

Plantas semelhantes: Scandix australis.



APIACEAE




20 m
a 630 m
(820 m)

Bifora testiculata

COENTROS-BRAVOS*

Ecologia: arvense; em solos básicos.



APIACEAE



190 m
a 250 m

Apium nodiflorum

RABAÇA, SALSA-BRAVA

Ecologia: em águas doces, paradas ou de corrente lenta.

Plantas semelhantes: *Apium repens*.



APIACEAE



5 m
a 790 m
(940 m)

Oenanthe crocata

EMBUDE, RABAÇAS, PREGO-DO-DIABO,
SALSA-PARRILHA

Ecologia: prados húmidos, ribeiros, lagoas; anfíbia; indiferente edáfica.

Plantas semelhantes: outras espécies do género *Oenanthe*.



APIACEAE



10 m
a 850 m
(1140 m)

Carum verticillatum

ALCARAVIA, COMINHO-DOS-PRADOS

Ecologia: prados húmidos.

Plantas semelhantes: *Daucus crinitus*.



APIACEAE



10 m
a 1360 m
(1690 m)




Crithmum maritimum

FUNCHO-MARÍTIMO, PERREXIL-DO-MAR

Ecologia: arribas litorais, raramente em areias.



APIACEAE



Seseli tortuosum

SALSA-DAS-PRAIAS, COMINHO-DAS-AREIAS, COMINHO-DE-MARSELHA

Ecologia: dunas, raramente em arribas e taludes de salinas.



APIACEAE



Anthriscus caucalis


ANTRISCOS*

Ecologia: pousios, sebes e orlas de matagais; em locais algo nitrofilizados e secos.

Plantas semelhantes: Anthriscus sylvestris e Myrrhoides nodosa.



APIACEAE




Physospermum cornubiense


FALSO-BRUCO-DOS-BOSQUES*

Ecologia: clareiras de matos e bosques; em solos ácidos.

Plantas semelhantes: espécies do género Oenanthe, Chaerophyllum temulum.



APIACEAE



Myrrhoides nodosa


MIRROIDES*

Ecologia: orlas de bosques, prados, sebes; em locais sombrios, nitrófila.

Plantas semelhantes: *Anthriscus sylvestris*, *Chaerophyllum temulum*.



APIACEAE




Chaerophyllum temulum


CEREFOLHO, CEREFÓLIO

Ecologia: orlas de bosques e matagais; em solos frescos, algo nitrófila.

Plantas semelhantes: espécies do género *Anthriscus*, *Myrrhoides nodosa*, *Physospermum cornubiense*.



APIACEAE




Pimpinella villosa

ERVA-DOCE-BASTARDA

Ecologia: clareiras de matos, bermas de caminhos; geralmente em solos ácidos.



APIACEAE




Conopodium majus subsp. marizianum


AGREICHO, CASTANHA-SUBTERRÂNEA-MENOR, BATATA-DA-ÍNDIA

Ecologia: bosques e matagais; em solos ácidos.

Plantas semelhantes: outras espécies dos géneros *Conopodium* e *Bunium*.



APIACEAE






Ammoides pusilla

ÂMIO-MENOR*

Ecologia: prados, bermas de caminhos; em solos preferentemente básicos.

Plantas semelhantes: *Daucus crinitus*, *Lagoecia cuminoides* (muito rara).



APIACEAE



60 m
a 460 m
(570 m)




Daucus crinitus

CENOURA-DE-FOLHAS-MIÚDAS*

Ecologia: clareiras de matos, pousios; em locais secos e soalheiros.

Plantas semelhantes: *Carum verticillatum*.



APIACEAE



20 m
a 500 m
(1010 m)




Daucus muricatus

CENOURA-BRAVA-HÍSPIDA*

Ecologia: campos agrícolas, pousios; arvense.

Plantas semelhantes: *Daucus carota*.



APIACEAE



10 m
a 260 m
(420 m)



Daucus carota subsp. halophilus

CENOURA-DAS-ARRIBAS*,

CENOURA-VICENTINA*

Ecologia: arribas litorais.

Plantas semelhantes: *Daucus carota* subsp. *gummifer*.



APIACEAE



0 m
a 110 m

Daucus carota subsp. carota

CENOURA-BRAVA

Ecologia: campos agrícolas, pastagens, bermas de caminhos; arvense e ruderal.

Plantas semelhantes: *Daucus carota* subsp. *maxima*, *D. muricatus*, *D. crinitus*.



APIACEAE



10 m
a 800 m
(1280 m)

Pseudorlaya minuscula

FALSA-CENOURA-MENOR*

Ecologia: dunas.

Plantas semelhantes: *Pseudorlaya pumila*.



APIACEAE



0 m
a 30 m

Torilis nodosa

SALSINHA-DE-CABEÇA-RENTE*

Ecologia: arvense.



APIACEAE



30 m
a 370 m
(720 m)

Torilis arvensis

SALSINHA-DOS-CAMPOS

Ecologia: arvense e ruderal.

Plantas semelhantes: outras espécies do género *Torilis*, *Orlaya daucoides*.



APIACEAE



10 m
a 780 m
(1490 m)




Ammi majus

ÂMIO-MAIOR*, ÂMIO-VULGAR*

Ecologia: pousios, bermas de caminhos.




APIACEAE




Ammi visnaga

BISNAGA-DAS-SEARAS, PALITEIRA,
NINHOS-DE-PERDIZ

Ecologia: pousios, bermas de caminhos.



APIACEAE



Tordylium maximum


TORDÍLIO-MAIOR*,
COENTROS-DAS-PANDEIRETAS*

Ecologia: orlas ripícolas, sebes, pousios.

Plantas semelhantes: Tordylium apulum.



APIACEAE




Peucedanum lancifolium


BRUCO

Ecologia: brejos, turfeiras, prados húmidos, lameiros;
em solos ácidos.

Plantas semelhantes: Peucedanum gallicum.



APIACEAE




Angelica sylvestris

ANGÉLICA-SILVESTRE, ERVA-PIOLHEIRA

Ecologia: orlas ripícolas, clareiras de bosques; em locais frescos e sombrios.

Plantas semelhantes: *Angelica major*.



APIACEAE



10 m
a 700 m
(940 m)

Conium maculatum

CICUTA, CEGUDE, ANSARINA-MALHADA

Ecologia: orlas de bosques ripícolas, terrenos incultos; nitrófila.



APIACEAE



10 m
a 830 m
(1050 m)

Magyaricus panacifolia

BRUCO-DE-FOLHA-LARGA*

Ecologia: orlas de matagais, bermas de caminhos.



APIACEAE




20 m
a 800 m

Heracleum sphondylium

BRANCA-URSINA, CANABRÁS

Ecologia: clareiras de bosques, orlas ripícolas; em locais sombrios.



APIACEAE



10 m
a 940 m
(1360 m)




Margotia gummifera

BRUCO-FÉTIDO

Ecologia: clareiras de matos e pinhais; em solos ácidos.

Plantas semelhantes: no estado vegetativo, *Elaeoselinum foetidum*.



I 0m
a 720m

APIACEAE




Sanicula europaea

SANÍCULA

Ecologia: bosques caducifólios; em zonas de montanha.



I 360m
a 1090m



APIACEAE

Anacyclus radiatus subsp. *radiatus*

PÃO-POSTO, PIMPOSTO

Ecologia: ruderal.

Plantas semelhantes: *Glebionis coronaria* (forma de lígulas amarelas).



ASTERACEAE



0 m
a 230 m

Coleostephus myconis

PAMPILHO-DE-MICÃO, PAMPILHO-DOS-CAMPOS, OLHOS-DE-BOI

Ecologia: arvense e ruderal.

Plantas semelhantes: *Glossopappus macrotus*, *Glebionis segetum*, *Lepidophorum repandum*.



ASTERACEAE



10 m
a 640 m
(940 m)

Glebionis segetum

PAMPILHO-DAS-SEARAS

Ecologia: arvense; acidófila.

Plantas semelhantes: *Coleostephus myconis*, *Glossopappus macrotus*.



ASTERACEAE



10 m
a 590 m
(760 m)

Lepidophorum repandum

MACELA-ESPATULADA

Ecologia: clareiras de matos e pinhais; em solos ácidos, em sítios algo húmidos e sombrios.

Plantas semelhantes: *Coleostephus myconis*.



ASTERACEAE




10 m
a 470 m
(820 m)




Leucanthemopsis flaveola

MALMEQUER-SULFUROSO*

Ecologia: prados rupícolas, clareiras de matos; em solos secos, ácidos.



ASTERACEAE




Asteriscus aquaticus


PAMPILHO-AQUÁTICO

Ecologia: prados anuais em clareiras de matos e pousios; em solos pedregosos ou argilosos, básicos.

Plantas semelhantes: Asteriscus maritimus.



ASTERACEAE




Asteriscus spinosus

PAMPILHO-ESPINHOSO

Ecologia: pousios, matos, bermas de caminhos; em solos secos.



ASTERACEAE



Asteriscus maritimus


PAMPILHO-MARÍTIMO

Ecologia: arribas litorais.

Plantas semelhantes: Asteriscus aquaticus.



ASTERACEAE



Calendula arvensis


ERVA-VAQUEIRA, BELAS-NOITES,
ERVA-DE-SANTA-MARIA

Ecologia: arvense e ruderal; indiferente edáfica.

Plantas semelhantes: *Calendula suffruticosa*.



ASTERACEAE



Calendula suffruticosa subsp. lusitanica


ERVA-VAQUEIRA-DOS-ROCHEDOS*

Ecologia: rupícola.

Plantas semelhantes: outras subspécies de *Calendula suffruticosa*, *C. arvensis*.



ASTERACEAE




Senecio gallicus


ERVA-LOIRA-DAS-AREIAS*

Ecologia: dunas e em solos arenosos do interior.

Plantas semelhantes: *Senecio leucanthemifolius*.



ASTERACEAE



Senecio jacobaea


ERVA-DE-SÃO-TIAGO, TASNA

Ecologia: pastagens, pousios, bermas de caminhos.

Plantas semelhantes: *Senecio aquaticus*, *S. erucifolius*.



ASTERACEAE






Senecio vulgaris

TASNEIRINHA, CARDO-MORTO

Ecologia: arvense e ruderal, mas também em bosques, matagais; indiferente edáfica.



ASTERACEAE





Senecio sylvaticus

ERVA-LOIRA-DE-FLOR-PEQUENA

Ecologia: clareiras de bosques, pinhais; preferentemente em solos arenosos, ácidos.

Plantas semelhantes: *Senecio lividus*.



ASTERACEAE





Doronicum plantagineum

DORÓNICO*

Ecologia: bosques, bases de rochedos; em locais sombrios, frescos.

Plantas semelhantes: *Doronicum carpetanum* (raro), *Senecio lopezii* (raro), *S. doronicum* (raro).




ASTERACEAE



Arnica montana subsp. atlantica

ARNICA

Ecologia: prados húmidos, lameiros, brejos e turfeiras.



ASTERACEAE

Tolpis barbata


OLHO-DE-MOCHO

Ecologia: pousios, pastagens e clareiras de matos; em solos ácidos.

Plantas semelhantes: Tolpis umbellata, Hispidella hispanica. No estado vegetativo, espécies do género Andryala.



ASTERACEAE




Pilosella castellana


PILOSELA-CASTELHANA*

Ecologia: pastagens, clareiras de bosques; em solos ácidos e pobres, em zonas de montanha.

Plantas semelhantes: outras espécies do género Pilosella e Hispidella hispanica.



ASTERACEAE



Hispidella hispanica


HISPIDELA*

Ecologia: pastagens, clareiras de bosques, matos, solos pedregosos; em solos ácidos, em zonas de montanha.

Plantas semelhantes: espécies do género Pilosella e Tolpis barbata.





ASTERACEAE



Arctotheca calendula

ERVA-GORDA

Ecologia: invasora em areias litorais.



ASTERACEAE





Pulicaria arabica subsp. *hispanica*


ERVA-PULGUEIRA, MATA-PULGAS

Ecologia: prados húmidos; em solos temporariamente encharcados e locais perturbados.

Plantas semelhantes: *Dittrichia graveolens*.




ASTERACEAE




Pulicaria odora

ERVA-MONTÃ

Ecologia: prados, matos, bosques; indiferente edáfica, mas em solos com alguma humidade temporária.



ASTERACEAE




Dittrichia graveolens


ÊNULA-CHEIROSA*, ERVA-DOS-BÁLSAMOS

Ecologia: pousios; em solos secos e algo nitrofilizados.

Plantas semelhantes: *Pulicaria arabica* subsp. *hispanica*.



ASTERACEAE



Dittrichia viscosa subsp. *viscosa*


TÂVEDA, TÂGUEDA, ÊNULA-PEGANHOSA

Ecologia: pastagens, incultos, bermas de caminhos; ruderal.

Plantas semelhantes: *Dittrichia viscosa* subsp. *revoluta*, *Solidago virgaurea*.



ASTERACEAE



Solidago virgaurea

VARA-DE-OURO

Ecologia: clareiras de matos e bosques, dunas; em solo arenoso, ácido.

Plantas semelhantes: *Dittrichia viscosa* subsp. *viscosa*, *Inula conyzae*, *Senecio pyrenaicus* subsp. *caespitosus* (raro).



ASTERACEAE




10 m
a 1870 m

Inula conyzae

ÊNULA-MAIOR*

Ecologia: clareiras de bosques e matagais.

Plantas semelhantes: *Solidago virgaurea*.



ASTERACEAE



40 m
a 930 m

Lactuca serriola

ALFACE-BRAVA-SERRADA*

Ecologia: ruderal, por vezes arvense ou rupícola; em solos secos e algo nitrofilizados.

Plantas semelhantes: *Lactuca virosa*.



ASTERACEAE




10 m
a 910 m
(1190 m)

Lactuca virosa

ALFACE-BRAVA-MAIOR

Ecologia: arvense e ruderal, também em clareiras de bosques, pousios; em solos frescos, revolvidos e nitrofilizados.


Plantas semelhantes: *Lactuca serriola*.



ASTERACEAE



10 m
a 1040 m
(1260 m)



Lactuca viminea

ALFACE-BRAVA-DAS-ROCHAS*

Ecologia: escarpas, cascalheiras, taludes, bermas de caminhos; em solos secos e pedregosos.


Plantas semelhantes: *Lactuca saligna*.



ASTERACEAE



30 m
a 1430 m
(1860 m)



Sonchus bulbosus

CONDRILO-DE-DIOSCÓRIDES

Ecologia: dunas e pinhais litorais.



ASTERACEAE



0 m
a 420 m
(650 m)



Sonchus asper

SERRALHA-ÂSPERA, SERRALHA-PRETA, SERRALHA-ESPINHOSA

Ecologia: arvense e ruderal.

Plantas semelhantes: *Sonchus oleraceus*, *S. tenerrimus*.



ASTERACEAE



10 m
a 900 m
(1080 m)



Sonchus oleraceus

SERRALHA, SERRALHA-MACIA

Ecologia: arvense e ruderal; indiferente edáfica.

Plantas semelhantes: *Sonchus tenerrimus*, *S. asper*.



ASTERACEAE



10 m
a 710 m
(1280 m)

Urospermum picroides


LEITUGA-DE-BURRO

Ecologia: arvense e ruderal, também em rochedos e clareiras de matos.

Plantas semelhantes: *Sonchus asper*.



ASTERACEAE



Lapsana communis subsp. communis


LABRESTO, LAPSANA

Ecologia: bosques, margens de cursos de água, bermas de caminhos; em locais sombrios, húmidos e perturbados.

Plantas semelhantes: *Crepis lampsanoides*, *Rhagadiolus edulis*.



ASTERACEAE



Reichardia picroides


LEITUGUINHA-DOS-CAMINHOS*

Ecologia: arvense e ruderal, por vezes rupícola; indiferente edáfica.

Plantas semelhantes: *Reichardia intermedia*.



ASTERACEAE



Reichardia gaditana

LEITUGUINHA-DAS-PRAIAS*

Ecologia: dunas.



ASTERACEAE





Crepis capillaris

ALMEIRÃO-BRANCO, ALMEIROA-BRANCA, BARBA-DE-FALCÃO

Ecologia: arvense e ruderal; em solos perturbados ou revolvidos.

Plantas semelhantes: *Crepis taraxacifolia* e outras do género *Crepis*.



10 m
a 950 m
(1490 m)

ASTERACEAE



Crepis taraxacifolia

ALMEIROA, ALMEIROSA

Ecologia: arvense e ruderal; em solos perturbados, nitrofilizados.

Plantas semelhantes: *Crepis capillaris* e outras espécies do género *Crepis*.



10 m
a 760 m
(1080 m)

ASTERACEAE



Crepis foetida

ALMEIROA-FÉTIDA, ALMEIROA-DOS-COMBOIOS

Ecologia: pousios, pastagens, clareiras de matos, bermas de caminhos; em sítios secos.

Plantas semelhantes: *Crepis taraxacifolia* e outras dos géneros *Crepis* e *Thrinia*.



20 m
a 660 m

ASTERACEAE



Chondrilla juncea

LEITUGA-BRANCA

Ecologia: bermas de caminhos, incultos, pastagens; em locais algo perturbados.



10 m
a 1080 m
(1460 m)

ASTERACEAE




Rhagadiolus edulis

RAGADIÓLO-COMESTÍVEL*

Ecologia: campos agrícolas, pousios e, por vezes, bermas de caminhos.

Plantas semelhantes: *Rhagadiolus stellatus*, *Lapsana communis*, espécies do género *Hedypnois*.



ASTERACEAE



10 m
a 680 m
(870 m)

Hedypnois rhagadioloides

ALFACE-DE-PORCO, ERVA-DO-LEITE,
ALFACE-DE-CRETA

Ecologia: campos cultivados, pousios, bermas de caminhos; em locais secos.

Plantas semelhantes: outras espécies do género *Hedypnois*, principalmente *H. cretica*.



ASTERACEAE



5 m
a 900 m

Hieracium sabaudum

HIERÁCIO-DOS-ARROIOS*

Ecologia: bosque, margens de ribeiras, bermas de caminhos; em solos ácidos.

Plantas semelhantes: espécies do género *Hieracium* e *Crepis lampsanoides*.



ASTERACEAE



30 m
a 1350 m

Hieracium umbellatum

HIERÁCIO-UMBELADO*

Ecologia: rochedos, em leitos de cheia de cursos de água ou orlas de bosques.

Plantas semelhantes: espécies do género *Hieracium* e *Crepis lampsanoides*.



ASTERACEAE



10 m
a 890 m



Hypochaeris radicata

ERVA-DAS-TETAS, LEITUGA-PELUDA*

Ecologia: pastagens, prados húmidos, desde dunas litorais à alta montanha; indiferente edáfica.


Plantas semelhantes: Hypochaeris glabra.



ASTERACEAE



10 m
a 1290 m
(1930 m)




Hypochaeris glabra

LEITUGA-GLABRA*

Ecologia: prados, clareiras de matos; geralmente em solos ácidos e arenosos, com alguma humidade.

Plantas semelhantes: Hypochaeris radicata, Reichardia intermedia.



ASTERACEAE



10 m
a 960 m
(1550 m)



Andryala arenaria

ALFACE-DAS-AREIAS*

Ecologia: prados ralos, clareiras de matos; em solos arenosos.

Plantas semelhantes: Andryala rothia.



ASTERACEAE



10 m
a 340 m
(520 m)



Andryala integrifolia

TRIPA-DE-OVELHA, ALFACE-DO-MONTE

Ecologia: pousios, pastagens; ruderal; indiferente edáfica.



ASTERACEAE



10 m
a 960 m
(1380 m)




DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. NÃO É PERMITIDA A COMERCIALIZAÇÃO

Andryala rothia


ERVA-POLVINHENTA

Ecologia: pousios, pastagens; em locais secos e substratos ácidos.

Plantas semelhantes: *Andryala arenaria*.




ASTERACEAE




Arnosseris minima

AMARELA*

Ecologia: prados anuais e clareiras de matos, em zonas de montanha; em solos ácidos.



ASTERACEAE




Thrincia hispida


LEITUGA-DOS-MONTES

Ecologia: arvense e em pousios, pastagens, clareiras de matos; indiferente edáfica.

Plantas semelhantes: *Thrincia saxatilis*, *T. tuberosa*.



ASTERACEAE





Thrincia tuberosa


LEITUGA-TUBEROSA*

Ecologia: pastagens, prados, clareiras de bosques; indiferente edáfica, em solos com alguma humidade.

Plantas semelhantes: *Thrincia saxatilis*, *T. hispida*.



ASTERACEAE





Picris hieracioides


RASPA-SAIAS-DO-NORTE*

Ecologia: bosques caducifólios e prados frescos.

Plantas semelhantes: espécies do género *Hieracium*.



ASTERACEAE




Taraxacum pinto-silvae


DENTE-DE-LEÃO

Ecologia: prados húmidos, pastagens, bosques, jardins; em solos nitrofilizados e húmidos.

Plantas semelhantes: outras espécies do género *Taraxacum*.



ASTERACEAE




Helminthotheca echioides

RASPA-SAIAS

Ecologia: arvense e ruderal.



ASTERACEAE




Helminthotheca spinosa

RASPA-SAIAS-ESPINHOSO

Ecologia: clareiras de bosques e matagais; indiferente edáfica.




ASTERACEAE



Scorzonera angustifolia

ESCORCIONEIRA-DE-FOLHA-ESTREITA*

Ecologia: clareiras de matos, pastagens; em locais secos e soalheiros, em solos pedregosos.



ASTERACEAE




40 m
a 810 m

Scorzonera hispanica var. crispata

ESCORCIONEIRA-DE-FOLHA-CRISPADA*

Ecologia: pousios, clareiras de matos; em solos argilosos, básicos.

Plantas semelhantes: outras subspécies de *Scorzonera hispanica*.



ASTERACEAE




90 m
a 170 m

Podosperrum laciniatum

ESCORCIONEIRA-LACINIADA*

Ecologia: pousios, pastagens, bermas de caminhos, orlas de sapal e salinas; em locais secos e descampados.



ASTERACEAE




5 m
a 790 m
(1320 m)

Scorzonera humilis

ESCORCIONEIRA-DOS-BREJOS*

Ecologia: prados e matos higrófilos, bosques; em locais sombrios, em solos húmidos e ácidos.



ASTERACEAE



20 m
a 1310 m



Tragopogon dubius


BARBAS-DE-BODE-AMARELO*

Ecologia: prados e pastagens; em solos algo nitrofilizados.

Plantas semelhantes: *Tragopogon porrifolius*, *T. crocifolius*.



ASTERACEAE




Bidens frondosa


ERVA-RAPA, CHATOS

Ecologia: invasora em margens de cursos de água.

Plantas semelhantes: *Bidens tripartita*.



ASTERACEAE




Achillea ageratum

MACELA-DE-SÃO-JOÃO,
MARCELA-MOURISCA, AGERATO

Ecologia: prados algo húmidos, orlas de bosques, bermas de caminhos.



ASTERACEAE




Otanthus maritimus

CORDEIRINHOS-DA-PRAIA

Ecologia: dunas.




ASTERACEAE




Cotula coronopifolia

BOTÕES-DE-LATÃO

Ecologia: naturalizada em estuários e outras zonas húmidas litorais; em solos arenosos, húmidos e salgados.



ASTERACEAE



Vogtia annua


ATANÁSIA-DAS-SEARAS*,
JOINA-DAS-SEARAS

Ecologia: pousios e restos.

Plantas semelhantes: *Vogtia microphylla* (muito rara).



ASTERACEAE



Conyza bonariensis


AVOADINHA-PELUDA, ABOADEIRA

Ecologia: invasora em solos perturbados; ruderal e arvense.

Plantas semelhantes: *Conyza canadensis*.



ASTERACEAE



Conyza canadensis


AVOADINHA-DO-CANADÁ

Ecologia: invasora em solos perturbados; ruderal e arvense.

Plantas semelhantes: *Conyza bonariensis*.



ASTERACEAE






Phagnalon rupestre

ALECRIM-DAS-PAREDES-MENOR*

Ecologia: fendas de rochedos, clareiras de matos, arribas litorais; em solos rochosos ou pedregosos, básicos.


Plantas semelhantes: *Phagnalon saxatile*.



ASTERACEAE



10 m
a 280 m
(490 m)



Trifolium campestre

TREVÃO, TREVO-AMARELO

Ecologia: pousios, pastagens, clareiras de matos, bermas de caminhos; em solos algo nitrofilizados e secos.

Plantas semelhantes: *Trifolium dubium*.



FABACEAE



10 m
a 830 m
(1160 m)



Thalictrum speciosissimum

RUIBARBO-DOS-POBRES

Ecologia: prados higrofilos, margens de cursos de água; em solos húmidos.

Plantas semelhantes: *Thalictrum minus*.



RANUNCULACEAE




10 m
a 950 m
(1120 m)



Bupleurum lancifolium

PERFOLHADA

Ecologia: arvense; em solos básicos.



APIACEAE



50 m
a 290 m

Cachrys sicula

FÉRULA-ANÃ*

Ecologia: pousios, bermas de caminhos; em solos básicos.

Plantas semelhantes: *Cachrys libanotis*.



APIACEAE




10 m
a 340 m
(480 m)

Prangos trifida

ERVA-ISQUEIRA, BUGALHÓ

Ecologia: pousios, clareiras de matos, bermas de caminhos; geralmente em solos básicos.

Plantas semelhantes: no estado vegetativo, espécies do género *Cachrys*.



APIACEAE



10 m
a 300 m
(420 m)

Ferula communis subsp. catalaunica

CANAFRECHA, FÉRULA-COMUM

Ecologia: orlas de matagais e bosques; em solos frescos, geralmente pedregosos.

Plantas semelhantes: no estado vegetativo, *Foeniculum vulgare*, *Prangos trifida* e espécies do género *Cachrys*.



APIACEAE



5 m
a 630 m
(780 m)

Ferulago capillaris

FÉRULA-MENOR

Ecologia: orlas de matagais; em sítios secos.

Plantas semelhantes: espécies do género *Thapsia*.



APIACEAE



(310 m)
450 m
a 940 m



Foeniculum vulgare

FUNCHO, ERVA-DOCE, FOLHO

Ecologia: pousios, bermas de caminhos; ruderal.

Plantas semelhantes: no estado vegetativo, *Ferula communis* e *Distichoselinum tenuifolium*.



APIACEAE



10 m
a 680 m
(940 m)




Smyrniolus satrum

SALSA-DE-CAVALO, CEGUDES,
AIPO-DE-CAVALO

Ecologia: orlas de bosques ripícolas, olivais, terrenos
incultos, escarpas; em locais sombrios; nitrófila.

Plantas semelhantes: no estado vegetativo,
Smyrniolus perfoliatum.



APIACEAE




10 m
a 630 m
(800 m)



Ridolfia segetum

ENDRO, FUNCHO-BASTARDO

Ecologia: campos agrícolas, pousios; geralmente
em solo básico.



APIACEAE



20 m
a 260 m



Distichoselinum tenuifolium

TÂPSIA-DE-FOLHA-FINA*

Ecologia: clareiras de matos e rochedos; em solos
secos, pedregosos e básicos.

Plantas semelhantes: espécies do género *Thapsia*
e *Elaeoselinum foetidum*. No estado vegetativo,
Foeniculum vulgare.



APIACEAE



10 m
a 400 m

Elaeoselinum foetidum


TÂPSIA-FÉTIDA*, RABAÇA-FEDORENTA*

Ecologia: orlas de bosques e de matagais; em locais sombrios, com solos ácidos.

Plantas semelhantes: no estado vegetativo, *Margotia gummifera* e *Distichoselinum tenuifolium*.



APIACEAE




Thapsia minor


TÂPSIA-MENOR

Ecologia: clareiras de matos e sob coberto de pinhais e bosques perenifólios; em solos ácidos ou descarbonatados.

Plantas semelhantes: *Thapsia villosa*.



APIACEAE



Thapsia villosa


TÂPSIA, CANAVOURA

Ecologia: pousios, clareiras de matos e bosques, arribas litorais, bermas de caminhos, rochedos; indiferente edáfica.

Plantas semelhantes: *Thapsia minor*, *T. nitida*.



APIACEAE




Bupleurum rigidum subsp. paniculatum


BUPLAURO-RÍGIDO*

Ecologia: clareiras de matos; em locais soalheiros e solos pedregosos, básicos.

Plantas semelhantes: *Bupleurum rigidum* subsp. *rigidum*.



APIACEAE





Knautia nevadensis


ESCAIOSA-DOS-BOSQUES*

Ecologia: prados húmidos e bosques ripícolas; em zonas de montanha.

Plantas semelhantes: *Knautia subscaposa* e espécies do género *Scabiosa*.




ASTERACEAE




Eupatorium cannabinum

TREVO-CERVINO

Ecologia: margens de cursos de água, valas e orlas de bosques; em locais húmidos.



CAPRIFOLIACEAE




Centranthus ruber

ALFINETES, CUIDADO-DOS-HOMENS

Ecologia: fendas de rochas e muros; rupícola e algo nitrófila; também cultivada.




CAPRIFOLIACEAE




Valeriana tuberosa

VALERIANA-COMUM

Ecologia: orlas de matos e bosques; em substratos básicos.



CAPRIFOLIACEAE



Anthyllis vulneraria subsp. *maura*

VULNERÁRIA-ROSADA*

Ecologia: clareiras de matos, arribas litorais; em solos secos e pedregosos.

Plantas semelhantes: *Anthyllis vulneraria* subsp. *lusitanica*; *Anthyllis vulneraria* subsp. *gandogeri*.



FABACEAE



0 m
a 490 m

Dorycnopsis gerardi

VULNERÁRIA-MENOR*, ALBAIDA

Ecologia: orlas de matagais e de bosques, taludes, prados; em solos ácidos, frequentemente com humidade superficial.



FABACEAE



20 m
a 710 m
(970 m)

Trifolium angustifolium

RABO-DE-GATO, TREVO-MASSAROCO

Ecologia: pousios, pastagens, clareiras de matos, bermas de caminhos; em solos pobres e secos.



FABACEAE



5 m
a 790 m
(1080 m)

Trifolium arvense

PÉ-DE-LEBRE, TREVO-DOS-CAMPOS

Ecologia: pousios, pastagens, clareiras de matos, bermas de caminhos; em solos pobres e secos.



FABACEAE



5 m
a 1600 m



Trifolium tomentosum

TREVO-TOMENTOSO, TREVO-BOLINHA*

Ecologia: pousios, pastagens, bermas de caminhos; em solos algo compactados.



FABACEAE

10m
a 830m
(1030m)



Trifolium stellatum

TREVO-ESTRELADO

Ecologia: pousios, pastagens, clareiras de matos, bermas de caminhos; em solos pobres, pedregosos e secos.



FABACEAE

5m
a 700m
(1020m)



Trifolium resupinatum

TREVO-DA-PÉRSIA,
TREVO-DE-FLORES-REVIRADAS

Ecologia: prados e pastagens; em solos húmidos e nitrofilizados.

Plantas semelhantes: Trifolium suaveolens, T. strictum, T. spumosum.



FABACEAE

10m
a 580m
(750m)



Trifolium pratense

TREVO-DOS-PRADOS, TREVO-ROSADO

Ecologia: prados, lameiros e pastagens; em solos frescos e nitrofilizados.

Plantas semelhantes: Trifolium medium.



FABACEAE


10m
a 1120m
(1370m)

Armeria beirana

ARMÉRIA-DAS-BEIRAS*

Ecologia: prados de montanha.

Plantas semelhantes: *Arenaria pseudoarmeria*.



PLUMBAGINACEAE




20 m
a 1590 m
(1750 m)

Armeria rouyana

ARMÉRIA-DO-SADO*

Ecologia: clareiras de matos e pinhais litorais; em solo arenoso e seco.

Plantas semelhantes: *Armeria pinifolia*.



NT



PLUMBAGINACEAE



10 m
a 90 m

Armeria humilis

ARMÉRIA-MIÚDA*

Ecologia: prados de montanha e afloramentos rochosos.

Plantas semelhantes: *Armeria eriophylla*.



PLUMBAGINACEAE



730 m
a 1500 m

Armeria welwitschii

ERVA-DIVINA, RAIZ-DIVINA

Ecologia: dunas e arribas litorais.

Plantas semelhantes: *Armeria pungens*.



PLUMBAGINACEAE



0 m
a 90 m




Armeria pungens

**CRAVEIRO-DAS-AREIAS,
ARMÉRIA-DAS-PRAIAS***

Ecologia: dunas e arribas litorais.

Plantas semelhantes: *Armeria welwitschii*.



PLUMBAGINACEAE



0 m
I a 70 m
(100 m)

Aster tripolium

ESTRELA-DO-SAPAL*,
MALMEQUER-DO-SAPAL*

Ecologia: sapais, estuários; em solos salgados, frequentemente encharcados.

Plantas semelhantes: no estado vegetativo, *Limonium vulgare*.



ASTERACEAE




0 m
a 20 m

Geropogon hybridus

BARBAS-DE-BODE-MENOR*,
CRAVEIRO-DA-SERRA

Ecologia: arvense e em pousios; em solos pedregosos, básicos.

Plantas semelhantes: no estado vegetativo, espécies do género *Tragopogon*.



ASTERACEAE



10 m
a 300 m
(440 m)

Cichorium intybus

CHICÓRIA-DO-CAFÉ, ALMEIRÃO

Ecologia: campos agrícolas, pousios, bermas de caminhos.

Plantas semelhantes: *Cichorium endivia*.



ASTERACEAE




10 m
a 460 m
(720 m)

Succisa pratensis

ESCABIOSA-DOS-PRADOS,
ERVA-DE-SÃO-JOSÉ, MORSO-DO-DIABO

Ecologia: prados húmidos, turfeiras.

Plantas semelhantes: *Succisa pinnatifida*, espécies do género *Scabiosa*.



CAPRIFOLIACEAE



(50 m)
420 m
a 1470 m



Scabiosa atropurpurea

SAUDADES-ROXAS, SUSPIROS,
SUSPIROS-ROXOS

Ecologia: bermas de caminhos, pastagens, pousios;
indiferente edáfica.

Plantas semelhantes: outras espécies do género
Scabiosa.



CAPRIFOLIACEAE



5 m
a 460 m
(1190 m)



Lomelosia simplex

ESCABIOSA-SIMPLES*

Ecologia: arvense e ruderal; em solos básicos.


Plantas semelhantes: *Lomelosia stellata* e espécies
do género *Scabiosa*.



CAPRIFOLIACEAE



40 m
a 300 m



Ptercephalidium diandrum

CABEÇA-DE-PLUMAS*

Ecologia: clareiras de matos e pinhais; em solos secos
e ácidos.

Plantas semelhantes: *Pycnocomon intermedium*.



CAPRIFOLIACEAE



10 m
a 980 m
(1110 m)



Pycnocomon intermedium

ESCABIOSA-DAS-AREIAS*,
PERPÉTUAS-ROXAS-DA-PRAIA

Ecologia: clareiras de matos e pinhais; em solos
arenosos.


Plantas semelhantes: *Ptercephalidium diandrum*.



CAPRIFOLIACEAE



10 m
a 120 m



Bituminaria bituminosa

TREVO-BETUMINOSO

Ecologia: arvense e ruderal, mas também em rochedos, arribas litorais, orlas de bosques e matagais.



FABACEAE



10 m
a 580 m
(890 m)

Iberis ciliata subsp. contracta

ASSEMBLEIAS-ROSADAS*

Ecologia: clareiras de matos; em solos argilosos e pedregosos, descarboxados.

Plantas semelhantes: Iberis ciliata subsp. welwitschii.



BRASSICACEAE



10 m
a 760 m

Mentha pulegium

POEJO, HORTELÃ-PIMENTA-MANSA

Ecologia: margens de lagoas, charcos e cursos de água temporários; em solos ácidos, húmidos.



LAMIACEAE




5 m
a 820 m
(1120 m)

Mentha aquatica

HORTELÃ-DE-ÁGUA

Ecologia: margens de lagoas e cursos de água; em sítios encharcados.



LAMIACEAE



5 m
a 460 m
(890 m)




Nepeta tuberosa

NÊVEDA-TUBEROSA*

Ecologia: pousios, pastagens; em solos básicos.

Plantas semelhantes: *Nepeta multibracteata*.



LAMIACEAE




20 m
a 490 m
(620 m)



Trachelium caeruleum

FLOR-DE-VIÚVA, VIÚVAS

Ecologia: fendas de muros e paredes, taludes; em sítios algo húmidos.



10 m
a 370 m


CAMPANULACEAE



Globularia vulgaris

GLOBULÁRIA-VULGAR*

Ecologia: clareiras de matos, taludes, rochedos; preferentemente em solos básicos.



60 m
a 470 m

PLANTAGINACEAE




Jasione montana

BOTÃO-AZUL

Ecologia: pousios, clareiras de matos, rochedos; em solos pobres; indiferente edáfica.

Plantas semelhantes: outras espécies do género *Jasione*.



5 m
a 1550 m

CAMPANULACEAE

Jasione sessiliflora

BOTÃO-AZUL-DAS-MONTANHAS*

Ecologia: pastagens secas, rochedos; em solos pedregosos, graníticos ou ultrabásicos.

Plantas semelhantes: outras espécies do género *Jasione*.



CAMPANULACEAE



(340m)
560 m
a 1900m

Limonium algarvense

LIMÔNIO-DO-ALGARVE*

Ecologia: sapais; em solos arenosos, salgadiços.

Plantas semelhantes: *Limonium lanceolatum*, *L. ovalifolium*.



PLUMBAGINACEAE



0m
a 20m

Limonium vulgare

LIMÔNIO-DOS-SAPAI, LAVANDA-DO-MAR

Ecologia: sapais, estuários.

Plantas semelhantes: *Limonium maritimum*, *L. narbonense*.



PLUMBAGINACEAE



0m
a 20m

Limonium virgatum

LIMÔNIO-DAS-ARRIBAS*

Ecologia: arribas litorais.

Plantas semelhantes: *Limonium multiflorum*, *L. dodartii*, *L. plurisquamatum*.



PLUMBAGINACEAE



0m
a 90m



Limonium nydeggeri

LIMÓNIO-DE-SÃO-VICENTE*

Ecologia: arribas litorais.

Plantas semelhantes: *Limonium ovalifolium*.



PLUMBAGINACEAE



I 0m
a 60m

Limonium ferulaceum

LIMÓNIO-SECO*

Ecologia: sapais e arribas litorais; em solos salgados.

Plantas semelhantes: *Limonium multiflorum*, *L. dodartii*, *L. plurisquamatum*.



PLUMBAGINACEAE



7. HERBÁCEAS COM FLOR TIPO CARDO

Dipsacus comosus

CARDO-PENTEADOR-BRAVO*

Ecologia: pousios, bermas de caminhos; em solos algo húmidos e nitrofilizados.

Plantas semelhantes: *Dipsacus fullonum*, *D. sativus*.



CAPRIFOLIACEAE



10 m
a 690 m
(800 m)

Scolymus hispanicus

CARDO-DE-OURO, TENGARRINHA, CANGARINHA

Ecologia: pastagens, pousios, bermas de caminhos; em locais soalheiros e solos nitrofilizados.

Plantas semelhantes: *Scolymus maculatus*.



ASTERACEAE



0 m
a 520 m
(760 m)

Carlina corymbosa

CARDO-AMARELO, CARDOL

Ecologia: clareiras de matos; indiferente edáfica.

Plantas semelhantes: *Carlina vulgaris*.



ASTERACEAE




10 m
a 810 m
(1280 m)

Carlina racemosa

CARDO-ASNIL

Ecologia: pastagens, pousios; indiferente edáfica.

Plantas semelhantes: *Carthamus lanatus*.



ASTERACEAE



10 m
a 450 m
(860 m)



Carthamus lanatus


CÂRTAMO-LANOSO*

Ecologia: arvense e ruderal; em sítios secos.

Plantas semelhantes: *Carlina racemosa*.




ASTERACEAE



Centaurea melitensis

CARDO-BEIJÁ-NA-MÃO,
CENTÁUREA-DE-MALTA

Ecologia: campos agrícolas, pousios, bermas de caminhos; em solos secos; indiferente edáfica.



ASTERACEAE




Centaurea benedicta

CARDO-BENTO, CARDO-SANTO

Ecologia: campos agrícolas, pousios, pastagens, bermas de caminhos; em solos secos.



ASTERACEAE




Centaurea ornata


CARDAZOL, LAVA-PÉ, CIGARRAS

Ecologia: pastagens, clareiras de matos, bermas de caminhos, rochedos em leitos de cheia; em solos secos algo nitrofilizados.

Plantas semelhantes: *Centaurea occasus*, *C. crocata* (ambas raras).



ASTERACEAE



Klasea flavescens subsp. *neglecta*

SERRÁTULA-AMARELA*

Ecologia: clareiras de matos; em solos pedregosos, básicos.



ASTERACEAE




40 m
a 370 m

Rhaponticoides africana

CENTÁUREA-AFRICANA*

Ecologia: matos e clareiras de bosques; geralmente em solos ácidos.



ASTERACEAE



20 m
a 300 m
(650 m)

Acanthoxanthium spinosum

ARZOLA, PICA-TRÊS,
ERVA-DE-SANTA-HELENA

Ecologia: infestante em campos agrícolas e pastagens; nitrófila



ASTERACEAE



10 m
a 830 m

Eryngium campestre

CARDO-CORREDOR, CARDO-DE-PALMA

Ecologia: pousios, pastagens; solos secos, pedregosos.



APIACEAE



10 m
a 830 m
(1020 m)




Rhapsiticum coniferum

CARDO-PINHEIRO-MENOR*

Ecologia: clareiras de matos e bosques; em solos pedregosos e básicos.

Plantas semelhantes: no estado vegetativo, espécies do género Klasea.



ASTERACEAE




50 m
a 640 m



Arcium minus

BARDANA, ERVA-DOS-TINHOSOS

Ecologia: prados nitrófilos, em bermas de caminhos e outros locais perturbados; ruderal; em locais frescos e algo ensombrados.



ASTERACEAE



10 m
a 1090 m
(1220 m)



Centaurea calcitrapa

CARDO-ESTRELADO

Ecologia: pastagens, bermas de caminhos; ruderal; em solos compactados e nitrófilizados.



ASTERACEAE



10 m
a 780 m
(990 m)




Centaurea polyacantha

OURIÇO-DAS-DUNAS*,
CARDAZOLA-DAS-AREIAS*

Ecologia: dunas e clareiras de matos em solos arenosos.

Plantas semelhantes: Centaurea sphaerocephala, C. susanna, C. lusitanica.



ASTERACEAE



0 m
a 150 m


Centaurea nigra subsp. rivularis

CENTÁUREA-DOS-LAMEIROS*

Ecologia: prados higrófilos, lameiros, bosques caducifólios, margens de linhas de água.



ASTERACEAE




10 m
a 1190 m
(1390 m)


Centaurea pullata

CARDINHO-DAS-ALMORREIMAS,
CENTÁUREA-PARDA

Ecologia: arvense e ruderal; geralmente em solos básicos.



ASTERACEAE



10 m
a 410 m
(650 m)


Crupina vulgaris

CRUPINA-COMUM*

Ecologia: clareiras de matos, prados anuais; em locais secos e pedregosos.



ASTERACEAE



80 m
a 830 m
(1180 m)

Galactites tomentosus

CARDO

Ecologia: arvense e ruderal, também em pastagens e clareiras de matos.



ASTERACEAE



10 m
a 550 m
(880 m)




Mantiscalca salmantica

CARDAZOLA-DOS-CAMINHOS*

Ecologia: pousios, bermas de caminhos; em solos secos, básicos.



ASTERACEAE





Klasea boetica subsp. lusitanica

SERRÁTULA-LUSITANA

Ecologia: clareiras de matos; em solos argilosos ou pedregosos, geralmente básicos.

Plantas semelhantes: outras espécies do género Klasea de flor rosa.



ASTERACEAE

Serratula tinctoria

SERRÁTULA-DOS-TINTUREIROS*

Ecologia: matos e prados higrófilos, turfeiras; em solos húmidos ácidos, geralmente em zonas de montanha.



ASTERACEAE



30 m
a 1420 m

Rhaponticoides fraylensis

CARDAZOLA-ROXA, CENTÁUREA-VICENTINA

Ecologia: matos, orlas de bosques e matagais; em solos ácidos.



ASTERACEAE




30 m
a 250 m
(450 m)

Cheirolophus sempervirens

LAVA-PÉ, VIOMAL

Ecologia: orlas de bosques e matagais; em locais sombrios.



ASTERACEAE





10 m
a 470 m

Cheirolophus uliginosus

LAVA-PÉ-DOS-BREJOS*

Ecologia: orlas de matagais higrófilos, brejos; em solos húmidos.

Plantas semelhantes: *Mantisalca salmantica*.



ASTERACEAE



10 m
a 270 m
(820 m)



Centaurea langei


CENTÁUREA-DO-NORTE*

Ecologia: prados secos, bermas de caminhos, rochedos; acidófila.

Plantas semelhantes: *Centaurea limbata*.




ASTERACEAE




Atractylis cancellata

CARDO-COROADO

Ecologia: prados anuais em clareiras de matos e pousios; em solos secos, pedregosos ou argilosos, geralmente básicos.



ASTERACEAE



Carlina gummifera


CARDO-DO-VISCO, MASTAGUEIRA

Ecologia: pastagens, pousios e clareiras de mato; em locais soalheiros e quentes.

Plantas semelhantes: no estado vegetativo, *Cynara algarbiensis* e *Scolymus hispanicus*.



ASTERACEAE



Cynara algarbiensis


ALCACHOFRA-ALGARVIA*

Ecologia: pastagens, clareiras de matos, bermas de caminhos; em solos ácidos.

Plantas semelhantes: *Cynara humilis*.



ASTERACEAE



Cynara humilis

ALCACHOFRAS-DE-SÃO-JOÃO,
ALCACHOFRAS-BRAVA

Ecologia: pastagens, pousios, clareiras de matos;
em locais soalheiros e secos.

Plantas semelhantes: *Cynara algarbiensis*, *C. tournefortii*
(no estado vegetativo).



ASTERACEAE




10 m
a 360 m
(550 m)



Cynara cardunculus

ALCACHOFRAS, CARDO-DO-COALHO

Ecologia: pastagens, pousios, bermas de caminhos;
em locais soalheiros e solos nitrofilizados.



ASTERACEAE



10 m
a 400 m
(670 m)



Cirsium arvense

CARDO-DAS-VINHAS, CARDO-
-HEMORROIDAL, CARDO-RASTEIRO

Ecologia: campos agrícolas, pousios, bermas
de caminhos; em solos algo húmidos e nitrofilizados.

Plantas semelhantes: *Cirsium palustre*.



ASTERACEAE



10 m
a 1050 m
(1210 m)



Cirsium palustre

CARDO-PALUSTRE

Ecologia: prados higrófilos, bosques paludosos;
em solos encharcados.

Plantas semelhantes: *Cirsium arvense*.



ASTERACEAE



10 m
a 1440 m





Cirsium filipendulum

CARDO-FILIPÊNDULA*

Ecologia: prados húmidos; em solos húmidos e arenosos.

Plantas semelhantes: *Cirsium welwitschii*.



ASTERACEAE



10m
a 1180m
(1350m)




Cirsium vulgare

CARDO-ROXO*

Ecologia: pousios, bermas de caminhos; em solos algo húmidos e perturbados.

Plantas semelhantes: *Cirsium scabrum* (raro).



ASTERACEAE



10m
a 1080m
(1980m)



Carduus carpetanus

CARDO-DA-MONTANHA*

Ecologia: pastagens e matos de montanha.


Plantas semelhantes: *Carduus gayanus*.



ASTERACEAE



570m
a 1550m
(1720m)



Carduus tenuiflorus

CARDO-COMUM

Ecologia: prados nitrófilos, pousios, entulhos; em solos soltos, perturbados e nitrificados.

Plantas semelhantes: *Carduus pycnocephalus*, *C. bourgeanus*.



ASTERACEAE



10m
a 930m
(1300m)

Carduus platypus


CARDO-DOS-BOSQUES*

Ecologia: clareiras de bosques, bermas de caminhos, pousios, margens de linhas de água; em solos frescos.

Plantas semelhantes: *Carduus broteroi*.



ASTERACEAE




(190m)
370 m
a 1050 m

Carduncellus caeruleus


CARDO-AZUL

Ecologia: pousios, clareiras de matos; geralmente em solos básicos.

Plantas semelhantes: *Carduncellus cuatrecasii* (raro).



ASTERACEAE



10 m
a 290 m
(500 m)

Notobasis syriaca


CARDO-ESPINHOSO*

Ecologia: pousios, bermas de caminhos; em solos secos, básicos, algo nitrofilizados.

Plantas semelhantes: *Cirsium vulgare*.



ASTERACEAE




10 m
a 300 m
(410 m)

Picnomon acarna


CARDO-ESPINHOSO-DAS-PASTAGENS*

Ecologia: pousios e clareiras de matos; em solos básicos.

Plantas semelhantes: no estado vegetativo, *Carthamus lanatus*.



ASTERACEAE



60 m
a 720 m

Eryngium dilatatum

CARDO-AZUL-DOS-MATOS

Ecologia: clareiras de matos; solos secos, pedregosos.

Plantas semelhantes: *Eryngium tenue*.



APIACEAE




20 m
a 360 m
(540 m)

Eryngium duriae

CARDO-VERDE*

Ecologia: orlas de bosques e matos, taludes; em locais frescos, em zonas de montanha.



APIACEAE



(450 m)
650 m
a 1860 m

Eryngium maritimum

CARDO-MARÍTIMO,
CARDO-ROLADOR

Ecologia: dunas.



0 m
a 20 m

APIACEAE

8. HERBÁCEAS BOLBOSAS E SIMILARES



Anthericum liliago

AÇUCENA-FINA*, FALANGERA

Ecologia: clareiras de matos; em locais soalheiros, secos; em substratos diversos.

Plantas semelhantes: espécies do género *Ornithogalum*



ASPARAGACEAE




I 130 m
a 810 m



Leucojum autumnale

CAMPAINHAS-DO-OUTONO,
CHORAMINGAS, LÁGRIMAS-DO-OUTONO

Ecologia: clareiras de matos e bosques; em solos arenosos ou argilosos.



AMARYLLIDACEAE




10 m
a 590 m
(950 m)



Leucojum trichophyllum

CAMPAINHAS-DA-PRIMAVERA,
LÁGRIMAS-DA-PRIMAVERA

Ecologia: clareiras de matos e bosques; em solos arenosos.



AMARYLLIDACEAE




10 m
a 110 m
(260 m)



Allium triquetrum

ALHINHO-DE-JARDIM,
ALHO-TRIANGULAR-BRANCO

Ecologia: orlas de bosques, incultos; em locais sombrios; também cultivada.



AMARYLLIDACEAE



10 m
a 470 m




Allium paniculatum

ALHO-PANICULADO*

Ecologia: clareiras de matos, rochedos; em solos pedregosos.

Plantas semelhantes: *Allium oleraceum*, *A. stearnii* (ambos raros).



AMARYLLIDACEAE



30 m
a 760 m
(1290 m)

Allium subvillosum


ALHO-DAS-AREIAS

Ecologia: dunas.

Plantas semelhantes: *Allium roseum*.



AMARYLLIDACEAE




10 m
a 60 m

Allium vineale


ALHO-DAS-VINHAS

Ecologia: campos agrícolas, pousios, bermas.

Plantas semelhantes: *Allium guttatum*, *Allium sphaerocephalon*.



AMARYLLIDACEAE



10 m
a 960 m

Allium massaessylum


PORRINHO, ALHO-DE-MARROCOS

Ecologia: bosques e matagais; em solos ácidos e pedregosos.

Plantas semelhantes: *Allium roseum*, *A. schmitzii*.



AMARYLLIDACEAE




70 m
a 980 m
(1090 m)

Allium roseum


ALHO-ROSADO, ALHO-DE-BRUXA

Ecologia: prados e clareiras de matos.

Plantas semelhantes: *Allium massaessylum*, *A. schmitzii*, *Nothoscordum gracile*.



AMARYLLIDACEAE




10 m
a 480 m
(640 m)




Allium neapolitanum

ALHO-BRANCO, ALHO-NAPOLITANO

Ecologia: prados húmidos, margens de cursos de água.



AMARYLLIDACEAE




Nothoscordum gracile


ALHO-SEM-CHEIRO, ALHO-AMERICANO

Ecologia: naturalizado na margem de rios e zonas urbanas; em locais frescos e algo húmidos.

Plantas semelhantes: Allium roseum.



AMARYLLIDACEAE




Ornithogalum concinnum


CEBOLINHO-PURO*

Ecologia: clareiras de matos, rochedos, pastagens; em solos pobres, ácidos.

Plantas semelhantes: Ornithogalum broteroi.



ASPARAGACEAE




Ornithogalum broteroi


CEBOLINHO-DONZELA*

Ecologia: clareiras de matos; em solos pobres, ácidos.

Plantas semelhantes: Ornithogalum concinnum.



ASPARAGACEAE




Ornithogalum narbonense

CEBOLINHO-ARVENSE*

Ecologia: pousios, campos agrícolas; em solos básicos.

Plantas semelhantes: *Ornithogalum pyrenaicum*.



ASPARAGACEAE




10 m
a 320 m
(440 m)

Ornithogalum orthophyllum subsp. baeticum

LEITE-DE-GALINHA

Ecologia: clareiras de matos, rochedos, pousios; em solos pedregosos, básicos ou ácidos.

Plantas semelhantes: *Ornithogalum gussonei*.



20 m
a 1100 m
(1310 m)

ASPARAGACEAE

Urginea maritima

CEBOLA-ALBARRÃ

Ecologia: clareiras de matos, fendas de rochas, prados ralos; em solos secos; indiferente edáfica.

Plantas semelhantes: no estado vegetativo, *Himantoglossum robertianum*.



10 m
a 540 m
(840 m)


ASPARAGACEAE

Paradisea lusitanica

VARINHA-DE-SÃO-JOSÉ,
AÇUCENA-PORTUGUESA

Ecologia: prados húmidos, orlas de bosques caducifólios e ripícolas; em solos húmidos e em zonas de montanha.

Plantas semelhantes: *Anthericum liliago*.



450 m
a 1110 m

ASPARAGACEAE



Simethis mattiazzii

CRAVO-DO-MONTE, CRAVEIRO-DO-MONTE, OUROPESO

Ecologia: clareiras de matos, pinhais e bosques; em solos arenosos ou pedregosos, ácidos.



XANTHORRHOACEAE




20 m
a 1120 m
(1420 m)



Asphodelus fistulosus

ABRÓTEA-FINA

Ecologia: pastagens, pousios, bermas de caminhos.



XANTHORRHOACEAE



0 m
a 260 m



Asphodelus aestivus

ABRÓTEA-DE-VERÃO

Ecologia: prados, pastagens, clareiras de matos; em substratos arenosos ou pedregosos, secos a húmidos.

Plantas semelhantes: outras espécies do género Asphodelus.



XANTHORRHOACEAE



20 m
a 660 m




Asphodelus ramosus subsp. distalis

ABRÓTEA-DE-PRIMAVERA

Ecologia: pastagens, pousios, clareiras de matos, bermas de caminhos; indiferente edáfica.

Plantas semelhantes: outras espécies do género Asphodelus.



XANTHORRHOACEAE



10 m
a 540 m
(1160 m)

Pancratium maritimum

LÍRIO-DAS-AREIAS, NARCISO-DAS-AREIAS

Ecologia: dunas e, menos frequentemente, arribas litorais.



AMARYLLIDACEAE




0m
a 40m

Narcissus serotinus

NARCISO-DO-OUTONO, NARCISO-DA-TARDE

Ecologia: prados húmidos e várzeas, margens de campos agrícolas; em solo argiloso.



AMARYLLIDACEAE




10m
a 310m

Narcissus papyraceus

MIJA-BURRO, NARCISO-DO-BARROCAL

Ecologia: clareiras de matos, em solos pedregosos; margens de cursos de água.

Plantas semelhantes: *Narcissus tazetta*.



AMARYLLIDACEAE




10m
a 440m

Platanthera bifolia

PLATANTERA*, ORQUÍDEA-BORBOLETA*

Ecologia: prados húmidos, pastagens, clareiras de matos e bosques; em locais soalheiros ou sombrios.

Plantas semelhantes: *Dactylorhiza sulphurea*, *D. insularis*, *Orchis provincialis*.



ORCHIDACEAE




260m
a 860m




Neotinea conica

ORQUÍDEA-BRANCA*

Ecologia: clareiras de matos e bosques; em solos calcários, geralmente descarbonatados e pobres.




ORCHIDACEAE




Neotinea maculata

NEOTÍNEA-MACULADA*

Ecologia: clareiras de bosques e matagais; indiferente edáfica.



ORCHIDACEAE




Spiranthes spiralis


TRANÇAS-DE-OUTONO,
ESPIRAL-DO-OUTONO

Ecologia: prados, clareiras de matos; em sítios secos; indiferente edáfica.

Plantas semelhantes: *Spiranthes aestivalis*.




ORCHIDACEAE



Zantedeschia aethiopica

JARRO, JARRO-DE-JARDIM,
JARRO-DAS-NOIVAS

Ecologia: naturalizada em bosques paludosos e margens de cursos de água; em solos encharcados; cultivada.




ARACEAE





ERVA-TOIRA, BRINCALHETA, PENACHOS

Plantas semelhantes: outras espécies do género *Orobanche*.



F



I 20 m
a 330 m




LC

Narcissus bulbocodium

CAMPAINHAS-AMARELAS, CUCOS, CAMPAINHAS-DOS-MONTES

Ecologia: prados, pastagens, afloramentos rochosos; indiferente edáfica.



AMARYLLIDACEAE



10m
a 1850m
(1980m)



Narcissus cyclamineus

MARTELINHOS, PUCARINHOS, MACHADINHOS

Ecologia: margens de cursos de água e prados húmidos de montanha.



AMARYLLIDACEAE



60m
a 960m




LC

Narcissus calcicola

NARCISO-CALCÍCOLA, NININAS

Ecologia: rupícola; em substratos básicos.

Plantas semelhantes: *Narcissus scaberulus*, *N. rupicola*.



AMARYLLIDACEAE



(10m)
180m
a 560m
(670m)



Narcissus gaditanus

JUNQUILHO-MARRECO*, JUNQUILHO-GADITANO*

Ecologia: clareiras de matos; em solos pedregosos, básicos.



AMARYLLIDACEAE



30m
a 450m

Narcissus asturiensis

NARCISO-DAS-ASTÚRIAS*, NARCISO-MENOR

Ecologia: prados e afloramentos rochosos; em zonas de montanha e substratos ácidos.

Plantas semelhantes: *Narcissus pseudonarcissus* subsp. *portensis*



NT



AMARYLLIDACEAE



(670m)
850 m
a 1970 m

Narcissus pseudonarcissus subsp. portensis

NARCISO-TROMBETA-DOURADO*

Ecologia: rupícola; em zonas de montanha e substratos ácidos.

Plantas semelhantes: *Narcissus asturiensis*, outras subspécies de *N. pseudonarcissus*.



AMARYLLIDACEAE



450 m
a 1140 m

Narcissus jonquilla

JUNQUILHO

Ecologia: margens de cursos de água.

Plantas semelhantes: *Narcissus fernandesii*, *N. willkommii*.



AMARYLLIDACEAE




30 m
a 240 m


Narcissus triandrus

CANTARINHOS, COPINHOS, CAMPANÁRIOS

Ecologia: clareiras de matos; em solos pedregosos e afloramentos rochosos, ácidos.



LC



AMARYLLIDACEAE



50 m
a 1270 m
(1520 m)



Tulipa sylvestris subsp. australis

TULIPA-BRAVA

Ecologia: clareiras de matos; em solos pedregosos, ácidos ou básicos.



LILIACEAE



30 m
a 1340 m
(1450 m)




Gagea soleirolii

ESTRELA-DO-INVERNO*,
GÂGEA-DA-MONTANHA*

Ecologia: prados e matos de montanha, fendas de rochas; sobre substratos ácidos.

Plantas semelhantes: outras espécies do género *Gagea*.



LILIACEAE



(290 m)
600 m
a 1650 m
(1980 m)



Narthecium ossifragum

QUEBRA-OSSOS

Ecologia: em escorrências de água e outros locais húmidos, em substratos pedregosos, ácidos.



NARTHECIACEAE




(240 m)
640 m
a 1420 m



Allium scorzonnerifolium

ALHO-AMARELO*

Ecologia: prados húmidos.



AMARYLLIDACEAE



(20 m)
850 m
a 1200 m
(1560 m)


Dipcadi serotinum

JACINTO-DA-TARDE, JACINTO-SERÔDIO

Ecologia: rochedos, pousios, clareiras de matos; em solos pedregosos, arenosos ou argilosos, ácidos.



ASPARAGACEAE




Ornithogalum pyrenaicum


CEBOLINHO-DOS-BOSQUES*

Ecologia: prados húmidos, clareiras de bosques, margens de cursos de água; em locais frescos e sombrios, geralmente ácidos.

Plantas semelhantes: Ornithogalum narbonense.



ASPARAGACEAE



Iris pseudacorus


LÍRIO-AMARELO-DOS-PÂNTANOS,
ÂCORO-BASTARDO

Ecologia: pauis, lagoas, valas, cursos de águas lentas; em solos encharcados.

Plantas semelhantes: no estado vegetativo, espécies dos géneros Typha e Sparganium.




IRIDACEAE




Ophrys lutea

ABELHINHA, ERVA-VESPA

Ecologia: prados, clareiras de matos; em solos pedregosos, geralmente básicos.



ORCHIDACEAE







Dactylorhiza sulphurea

ORQUÍDEA-SULFUROSA*

Ecologia: bosques, clareiras de matos e prados; em sítios algo ensombrados.

Plantas semelhantes: *Dactylorhiza insularis*, *Platanthera bifolia*, *Orchis provincialis*.



ORCHIDACEAE




I 230 m
a 760 m



Orchis anthropophora

ERVA-DO-HOMEM-ENFORCADO,
RAPAZINHOS

Ecologia: prados e clareiras de matos; em solos pedregosos, básicos.



ORCHIDACEAE



I 50 m
a 620 m



Neottia nidus-avis

ORQUÍDEA-NINHO-DE-PÁSSARO*

Ecologia: bosques caducifólios, pinhais; em sítios sombrios.

Plantas semelhantes: *Monotropa hypopitys*, espécies do género *Orobanche*.



ORCHIDACEAE



I 550 m
a 1080 m



Monotropa hypopitys

FALSO-NINHO-DE-PÁSSARO*

Ecologia: bosques e pinhais, alimentando-se de matéria orgânica em decomposição; em locais sombrios e húmidos.

Plantas semelhantes: *Neottia nidus-avis* e espécies do género *Orobanche*.



ERICACEAE



I 530 m
a 1160 m


Cistanche phelypaea

ERVA-TOIRA-DO-SAPAL, PIÇA-DE-CÃO

Ecologia: parasita de arbustivas, em sapais; em solos salgados.



OROBANCHACEAE




Orobanche minor


ERVA-TOIRA-MENOR,
ERVA-TOIRA-PEQUENA*

Ecologia: parasita de leguminosas herbáceas, em pousios, prados.

Plantas semelhantes: outras espécies do género *Orobanche*.



OROBANCHACEAE




Orobanche rapum-genistae


ERVA-TOIRA-MAIOR, RABO-DE-ZORRA

Ecologia: parasita de leguminosas arbustivas, em matos.

Plantas semelhantes: *Orobanche gracilis* e outras espécies do género *Orobanche*.



OROBANCHACEAE




Arum italicum


JARRO-DOS-CAMPOS, BIGALHÓ

Ecologia: bosques, sebes, pomares; em solos frescos; indiferente edáfica.

Plantas semelhantes: *Arum cylindraceum*.



ARACEAE






Isoetes histrix

CEBOLINHO-DOS-CHARCOS-ERIGADO*

Ecologia: em locais com solos temporariamente encharcados, arenosos ou arenoso-limosos.

Plantas semelhantes: outras espécies de *Isoetes*; diversas espécies de asparagáceas no estado vegetativo.



ISOETACEAE



10 m
I
a 630 m
(850 m)



Triglochin barrelieri

JUNQUINHO-DOS-SAPAI-S-DO-SUL*

Ecologia: prados em sapais e estuários; em solos húmidos e salgados.

Plantas semelhantes: *Triglochin laxiflora*.



JUNCAGINACEAE



0 m
I
a 10 m




Triglochin maritima

ERVA-DOS-SALGADIÇOS, ERVA-DO-BREJO, JUNQUINHO-DOS-SAPAI-S*

Ecologia: prados em sapais e estuários; em solos húmidos e salgados.

Plantas semelhantes: *Plantago maritima*, *Triglochin striata*.



0 m
I
a 20 m

JUNCAGINACEAE

Crocus serotinus

ÇAFRÃO-DE-OUTONO, PÉ-DE-BURRO

Ecologia: prados, clareiras de matos e pinhais; em solos arenosos.

Plantas semelhantes: *Crocus clusii* e espécies dos géneros *Merendera* e *Colchicum*.



IRIDACEAE



20 m
a 850 m

Crocus carpetanus

ÇAFRÃO-DA-PRIMAVERA

Ecologia: prados de montanha.

Plantas semelhantes: espécies dos géneros *Merendera* e *Colchicum*.



IRIDACEAE




(120 m)
490 m
a 1870 m
(1990 m)

Colchicum lusitanum

CÔLQUICO-LUSITANO*

Ecologia: clareiras de matagais; em locais secos e pedregosos, em substratos básicos.

Plantas semelhantes: *Colchicum multiflorum* e espécies dos géneros *Crocus* e *Merendera*.



COLCHICACEAE



40 m
a 450 m

Merendera montana

QUITA-MERENDAS, NOSELHA-DOS-MONTES

Ecologia: prados e matos de montanha.

Plantas semelhantes: *Merendera filifolia* e espécies dos géneros *Crocus* e *Colchicum*.



COLCHICACEAE



(90 m)
700 m
a 1470 m
(1840 m)



Erythronium dens-canis

DENTE-DE-CÃO

Ecologia: prados e matos de montanha.



LILIACEAE



I 840m
a 1480m



Gladiolus communis

CALCINHAS-DE-CUCO, ESPADANA-DOS-MONTES, GLADIÓLO-DO-MONTE

Ecologia: pousios, clareiras de matos, campos agrícolas.

Plantas semelhantes: *Gladiolus italicus*.



IRIDACEAE



I 10m
a 950m
(1300m)




Watsonia meriana

ESPIGOS, HASTES-DE-SÃO-JOSÉ

Ecologia: naturalizada em prados húmidos, margens de cursos de água.

Plantas semelhantes: outras iridáceas dos géneros *Watsonia*, *Chasmanthe* e *Tritonia*.



IRIDACEAE




I 20m
a 160m



Ophrys tenthredinifera

ERVA-ABELHÃO

Ecologia: prados, clareiras de matos; em solos algo húmidos, argilosos ou pedregosos, ácidos ou básicos.



ORCHIDACEAE



I 20m
a 430m
(570m)

Ophrys scolopax

FLOR-DOS-PASSARINHOS,
ERVA-ABELHA-DE-BICO*

Ecologia: prados, clareiras de matos; em solos pedregosos, geralmente básicos.

Plantas semelhantes: *Ophrys apifera*.



ORCHIDACEAE




40 m
a 470 m
(720 m)

Ophrys apifera

ERVA-ABELHA, ALPIVRE

Ecologia: prados, pastagens, clareiras de matos; em solos algo húmidos.

Plantas semelhantes: *Ophrys scolopax*.



ORCHIDACEAE



10 m
a 580 m
(720 m)

Himantoglossum robertianum

SALEPEIRA-GRANDE

Ecologia: prados e clareiras de matos; em solos pedregosos, básicos.

Plantas semelhantes: no estado vegetativo, *Urginea maritima*.



ORCHIDACEAE





10 m
a 540 m

Orchis italica

ERVA-DOS-MACAQUINHOS,
SALEPEIRA-DOS-MACAQUINHOS*

Ecologia: prados, clareiras de matos; em locais soalheiros, solos pobres, geralmente básicos.



ORCHIDACEAE



20 m
a 550 m





Orchis mascula

SATIRIÃO-MACHO, SALEPEIRA-MAIOR,
PATA-DE-LOBO

Ecologia: prados, clareiras de matos e bosques;
em locais com alguma sombra; indiferente edáfica.

Plantas semelhantes: *Orchis langei*, *Anacamptis morio*,
A. laxiflora.



ORCHIDACEAE




130 m
a 840 m
(1820 m)



Anacamptis pyramidalis

SATIRIÃO-MENOR, ORQUÍDEA-PIRAMIDAL

Ecologia: prados e clareiras de matos; em solos
pedregosos, básicos.



ORCHIDACEAE



10 m
a 420 m
(550 m)




Anacamptis morio

ERVA-DO- SALEPO, FATUA,
TESTÍCULO-DE-CÃO

Ecologia: prados, clareiras de matos; em locais
soalheiros; indiferente edáfica.

Plantas semelhantes: *Anacamptis laxiflora*, *Orchis langei*,
O. mascula.



ORCHIDACEAE




20 m
a 840 m
(1020 m)



Anacamptis coriophora

ERVA-PERCEVEJA, ERVA-DO-SALEPO

Ecologia: prados, clareiras de matos; em solos
argilosos ou pedregosos, básicos ou ácidos, algo
húmidos.



ORCHIDACEAE



40 m
a 890 m
(1170 m)

Dactylorhiza maculata

SATIRIÃO-MANCHADO

Ecologia: prados húmidos, matos higrófilos, turfeiras.

Plantas semelhantes: Dactylorhiza elata.



ORCHIDACEAE




(70 m)
450 m
a 1490 m

Orchis papilionacea

ERVA-BORBOLETA, SALEPEIRA-BORBOLETA*

Ecologia: prados, pastagens, clareiras de matos; indiferente edáfica.



ORCHIDACEAE



40 m
a 260 m

Serapias cordigera

ERVA-LÍNGUA-MAIOR*,
SERAPIÃO-DE-FLORES-GRANDES

Ecologia: prados, clareiras de bosques e matos; em solos ácidos.



ORCHIDACEAE



10 m
a 1030 m

Serapias lingua

ERVA-LÍNGUA

Ecologia: prados, pastagens, clareiras de matos; indiferente edáfica.

Plantas semelhantes: Serapias strictiflora.



ORCHIDACEAE



10 m
a 850 m
(1010 m)



Serapias parviflora

ERVA-LÍNGUA-MENOR*,
SERAPIÃO-DE-LÍNGUA-PEQUENA

Ecologia: prados, pastagens, clareiras de matos;
indiferente edáfica.



ORCHIDACEAE



10 m
a 500 m
(900 m)




Orobanche foetida

ERVA-TOIRA-DENEGRIDA

Ecologia: parasita de leguminosas, em areias litorais,
campos agrícolas, matos.

Plantas semelhantes: outras espécies do género
Orobanche.



OROBANCHACEAE



0 m
a 510 m



Orobanche gracilis

ERVA-TOIRA-ENSANGUENTADA,
PÚTEGAS-DE-RAPOSA

Ecologia: parasita de leguminosas, em matos.

Plantas semelhantes: *Orobanche rapum-genistae*
e outras espécies do género *Orobanche*.



OROBANCHACEAE



30 m
a 1270 m
(1380 m)




Cytinus hypocistis

COALHADAS, PÚTEGAS-AMARELAS

Ecologia: parasita de cistáceas, em matos.

Plantas semelhantes: *Cytinus ruber*.



CYTINACEAE



10 m
a 1450 m

Cytinus ruber

COALHADAS-VERMELHAS,
PÚTEGAS-VERMELHAS

Ecologia: parasita de cistáceas, em matos.

Plantas semelhantes: *Cytinus hypocistis*.



CYTINACEAE



50 m
a 520 m

Cynomorium coccineum

PIÇA-DE-MOURO,
CAGALHÃO-DE-FRADE

Ecologia: parasita de arbustivas, em arribas
litorais e sapais; em solos salgados.



0 m
a 10 m

CYNOMORIACEAE





Romulea bulbocodium

NOSELHA-COMUM

Ecologia: prados, clareiras de matos; desde dunas litorais à alta montanha.

Plantas semelhantes: *Romulea clusiana*, *R. columnae*.



IRIDACEAE



10 m
a 1070 m
(1440 m)



Romulea ramiflora

NOSELHA-RAMOSA*

Ecologia: pastagens, clareiras de matos.

Plantas semelhantes: no estado vegetativo, outras espécies do género *Romulea*.



IRIDACEAE



10 m
a 440 m
(1900 m)




Muscari comosum

JACINTO-DAS-SEARAS, NAZARENO

Ecologia: pousios, campos agrícolas; indiferente edáfica.

Plantas semelhantes: *Bellevalia hackelii*.



ASPARAGACEAE




5 m
a 760 m
(1000 m)



Muscari neglectum

CEBOLINHO-DE-FLOR-AZUL

Ecologia: prados, campos agrícolas, clareiras de matos, fendas de rochas; em solos pedregosos; indiferente edáfica.



ASPARAGACEAE



5 m
a 680 m

Bellevia hackelii

JACINTO-AZUL-DO-BARROCAL

Ecologia: fendas de rochas e clareiras de matos baixos; em solos pedregosos de origem calcária.

Plantas semelhantes: *Muscari comosum*.



ASPARAGACEAE



10 m
a 430 m

Scilla autumnalis

CILA-DE-OUTONO

Ecologia: prados, clareiras de matos, fendas de rochas; em solos pedregosos, arenosos ou argilosos, com alguma humidade.



ASPARAGACEAE



20 m
a 750 m
(1300 m)

Scilla monophyllos

CILA-DE-UMA-FOLHA

Ecologia: clareiras de matos, bosques e pinhais; em solos ácidos.

Plantas semelhantes: *Hyacinthoides vincentina*.



ASPARAGACEAE




10 m
a 890 m
(1280 m)

Scilla peruviana

CILA-DO-PERU, ALBARRÃ-DO-PERU

Ecologia: orlas de bosques e matagais e aziniais, prados húmidos nas margens de cursos de água; em solos argilosos, húmidos e preferentemente básicos.



ASPARAGACEAE



30 m
a 320 m




Hyacinthoides hispanica

JACINTO-DOS-CAMPOS

Ecologia: rochedos, matagais, bosques; em locais algo sombrios e em diversos tipos de substratos.

Plantas semelhantes: outras espécies do género Hyacinthoides.



ASPARAGACEAE



30 m
a 1380 m
(1750 m)



Allium ampeloprasum

ALHO-PORRO-BRAVO, ALHO-DE-VERÃO, CHALOTAS

Ecologia: pousios, clareiras de matos, arribas litorais; indiferente edáfica.

Plantas semelhantes: Allium baeticum.



AMARYLLIDACEAE



0 m
a 410 m
(990 m)



Allium sphaerocephalon

ALHO-BRAVO, ALHO-DAS-ROCHAS

Ecologia: clareiras de matos, prados, rochedos.

Plantas semelhantes: Allium pruinatum, A. guttatum, A. vineale.



AMARYLLIDACEAE




20 m
a 1510 m



Gynandris sisyrinchium

PÊ-DE-BURRO, MAIOS-PEQUENOS

Ecologia: pousios, pastagens, bermas de caminhos, arribas litorais; em solos secos, compactados ou pedregosos.



IRIDACEAE



10 m
a 360 m
(840 m)

Iris xiphium

MAIOS, LÍRIO-ROXO

Ecologia: clareiras de matos e de bosques, rochedos; em solos arenosos ou pedregosos.

Plantas semelhantes: *Gynandris sisyrinchium*, *Iris planifolia*.



IRIDACEAE




10 m
a 760 m

Iris planifolia

LÍRIO-DE-AMOR-PERFEITO*

Ecologia: pastagens e clareiras de matos; em solos de origem calcária, pedregosos ou algo compactados.

Plantas semelhantes: *Iris xiphium*, *Gynandris sisyrinchium*.



IRIDACEAE



30 m
a 310 m

Iris foetidissima

LÍRIO-FÉTIDO

Ecologia: bosques, matagais e sebes; em locais sombrios e frescos.



IRIDACEAE




10 m
a 370 m
(550 m)

Ophrys fusca subsp. fusca

MOSCARDO-FUSCO, ERVA-MOSCARDO

Ecologia: prados ralos, clareiras de matos; em solos pedregosos, básicos.

Plantas semelhantes: outras subspécies de *Ophrys fusca*.



ORCHIDACEAE



30 m
a 310 m
(470 m)





Ophrys speculum subsp. speculum

ABELHINHA, ERVA-ABELHA, ERVA-ESPELHO

Ecologia: prados, clareiras de matos; em solos pedregosos, geralmente básicos.

Plantas semelhantes: *Ophrys speculum* subsp. *lusitanica*.



ORCHIDACEAE




I 10 m
a 380 m



Ophrys bombyliflora

ERVA-MOSCA

Ecologia: prados ralos, clareiras de matos; em solos pedregosos, básicos.



ORCHIDACEAE



I 10 m
a 350 m
(510 m)




Limodorum abortivum

LIMODORO*, ORQUÍDEA-ABORTIVA

Ecologia: bosques e matagais; indiferente edáfica.

Plantas semelhantes: *Limodorum trabutianum*.



ORCHIDACEAE



I 20 m
a 630 m
(740 m)




Orobanche ramosa

ERVA-TOIRA-RAMOSA*

Ecologia: parasita de vários hospedeiros, em pousios, prados, clareiras de matos.

Plantas semelhantes: *Orobanche schultzei* (muito raro) e outras espécies do género *Orobanche*.



OROBANCHACEAE




I 20 m
a 540 m

Biarum arundanum

JARRO-CLANDESTINO*

Ecologia: pousios, clareiras de matos; em solos básicos.

Plantas semelhantes: *Biarum mendax*.



ARACEAE



60 m
a 530 m
(640 m)



Arisarum simorrhinum

CANDEIAS, CAPUZ-DE-FRADE

Ecologia: clareiras de matos, bosques, campos agrícolas; em sítios frescos, por vezes sombrios; indiferente edáfica.



ARACEAE

5 m
a 460 m
(650 m)